



Trabalhos Científicos

Título: Tricobezoar Gástrico: Relato De Caso E Revisão Da Literatura

Autores: JESSICA DE MELO GONÇALVES (HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA); KARINE BEZERRA CARVALHO (HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA); SAMMIA SILVA SOUSA (HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA); RITA DE CASSIA MATOS CARNEIRO (HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** O tricobezoar é resultante da ingestão de cabelo humano, bonecas, pelos de animais ou fibras de tapetes, sendo o tipo mais comum na faixa etária pediátrica com cerca de 90% dos casos ocorrendo em crianças e adolescentes do sexo feminino. Podem surgir sintomas gastrintestinais como dor abdominal, diarreia, vômitos e plenitude pós- prandial. **DESCRIÇÃO:** BSSR, 9 anos, sexo feminino, apresentando há 5 meses episódios intermitentes de dor abdominal. Avó notou uma massa na região do epigástrio uma semana antes da admissão. Nega febre e inapetência. Refere duas internações em 6 meses devido dor abdominal, diarreia e vômitos. Relata também ter observado que a criança corta os cabelos de alguma forma e já os viu na boca, mas não sabe precisar período de início. Ao exame físico se encontrava em bom estado geral, consciente, eupneica e hipocorada leve. Couro cabeludo com área de rarefação capilar na região biparietal Abdomo plano, flácido, indolor, com massa palpável no epigástrio, de 12cm, endurecida e com superfície lisa. Realizada tomografia computadorizada de abdome, com evidencia de massa intragástrica e posteriormente submetida gastrostomia por laparotomia com achado de tricobezoar. Após alta, encaminhada ao serviço de psicologia e psiquiatria. **DISCUSSÃO:** Na apresentação clínica, a intensidade dos sintomas está associada ao volume do bezoar, à elasticidade do estômago e ao surgimento de complicações. Todavia, o histórico clinico nem sempre é característico. As duas internações prévias não aconteceram na mesma instituição e os autores não tiveram acesso aos prontuários, mas as queixas relatadas já poderiam estar relacionadas ao tricobezoar, devido seu tamanho, porém a literatura disponível não apresenta com precisão o tempo de formação dos bezoares. **CONCLUSÃO:** O caso destaca a importância de se incluírem os bezoares entre os diagnósticos diferenciais de dor abdominal, particularmente em pacientes do sexo feminino, inseridas em um contexto facilitador de conflitos psicológicos.