



## Trabalhos Científicos

**Título:** Ausência De Eosinofilia Na Síndrome De Hipersensibilidade Induzida Por Drogas, Uma Dúvida Diagnóstica?

**Autores:** GUILHERME TRUPPA GIUNZIONI (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); MARCIO MARINHO CORREA DE BARROS (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); NATHÁLIA SOUSA VITAL (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); FABIANA YUKIE SONEHARA CORREA DE BARROS (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); FABIANA REGINA CONDINI (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); SAULO DUARTE PASSOS (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); MARIA DE FATIMA VALENTE RIZZO (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); ANA PAULA Z. S. FELGUEIRAS (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); ROSA ESTELA GAZETA (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); CELIA MARTINS CAMPANARO (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); DEBORA MORAIS CARDOSO (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); MARCIA BORGES MACHADO (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); ANDRÉ PRADO GRION (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); MAISA RIBEIRO DE SOUZA (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); PRISCILLA MACHADO FERNANDES (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ); PAULA ARAÚJO BORBA DE OLIVEIRA (FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: O termo DRESS (Drug Reaction With Eosinophilia And Systemic Symptoms), sugere eosinofilia como critério obrigatório para diagnóstico da patologia, entretanto cerca de 40% dos casos podem cursar sem esta alteração, como demonstrado em nosso caso. DESCRIÇÃO: Paciente de nove anos, em uso de carbamazepina há 45 dias, com queixa de febre há três dias, lesões de pele e prurido há 10 dias. Ao exame apresentava xerose cutânea, exantema maculopapular disseminado e linfonomegalia inguinal. Apresentava também atipia linfocitária, elevação de transaminases, leucocitose sem desvio e ausência de eosinofilia (que se manteve durante todo o quadro). Foi internada com hipótese diagnóstica de DRESS, mas devido à ausência de eosinofilia, teve este diagnóstico descartado, sendo elaboradas outras hipóteses diagnósticas. Entretanto, quando aplicados os scores diagnósticos RegiSCAR e J-SCAR, definiu-se o diagnóstico como DRESS. DISCUSSÃO: A Síndrome de hipersensibilidade induzida por drogas (SHID) anteriormente denominada DRESS, é uma reação adversa a drogas rara, potencialmente fatal, caracterizada por erupção cutânea generalizada, acompanhada de envolvimento multissistêmico, com um período de latência que varia de 2 a 6 semanas. As drogas mais frequentemente envolvidas são: anticonvulsivantes aromáticos e alopurinol. Se apresenta como exantema associado a febre, linfadenopatia e acometimento sistêmico. As alterações laboratoriais mais frequentes são atipia linfocitária, eosinofilia e elevação de transaminases. CONCLUSÃO Pelo exposto, pode-se sugerir que a substituição do termo DRESS por Síndrome de hipersensibilidade induzida por drogas possa ser uma boa opção, a fim de evitar a ideia de que a presença de eosinofilia é obrigatória para o diagnóstico de tal patologia. O conhecimento do quadro clínico bem como dos critérios diagnósticos são fundamentais para o reconhecimento e tratamento precoce da doença, evitando assim atraso no diagnóstico, como o que ocorreu no caso descrito.