



Trabalhos Científicos

Título: Aleitamento Materno Em Recém-Nascidos Prematuros

Autores: VANESSA CARVALHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)); DENISE PEREIRA (UFSC); RENATA TOMAZZONI (UFSC); MONALISA VILELA (UFSC); CAROLINE MENEGUZZI (UFSC); JÚLIA FERÁBOLI (UFSC); BÁRBARA CUNHA (UFSC); ANA CRISTINA MORAES (UFSC); MARCELLA RIBEIRO (UFSC); CAROLINE MARTINELLI (UFSC); TÂNIA MEDRANO (UFSC); SUELY GROSSEMAN (UFSC)

Resumo: Introdução: Os benefícios do aleitamento materno (AM) nos primeiros 6 meses (6m) de vida para os recém-nascidos prematuros (RNPT) e a carência de estudos na população em questão, justificam esse estudo. Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência do AM, exclusivo (AME) ou não, e fatores que a influenciaram em RNPT que necessitaram internação em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital Amigo da Criança. Métodos: Coorte com 41 mães de RNPT internados na UTIN de um hospital público do sul do Brasil, entre julho/2015 e julho/2016. Coleta de dados: entrevista na UTIN, obtendo dados dos pais, do RNPT e da internação e, por telefone, após a criança ter completado 3 meses (3m) e 6m de vida, com variáveis referentes ao AM. Análise: estatística descritiva, teste t-student e qui-quadrado, considerando-se significativo $p < 0,05$. Resultados: Na alta, 31 de 41 mães amamentavam seus filhos (75,6%), sendo 10 em AME (24,4%). Aos 3m, entre 28 mães contatadas destas 31, 24 estavam amamentando, sendo 10 em AME. Aos 6m, 20 estavam amamentando, sendo 6 em AME. Portanto, a prevalência de AM e AME aos 3m entre 38 RNPT foi, respectivamente, 63,2% e 26,3% e, aos 6m, 52,6% e 15,8%. Houve associação entre AME aos 3m com RNPT do sexo feminino ($p=0,02$) e maior tempo de AM prévio ($p=0,001$), e, aos 6 meses, com RNPT sexo feminino ($p=0,001$), não ter tido dificuldades para amamentar ($p=0,004$) e não utilizar chupeta ($p=0,006$), nem mamadeira ($p=0,001$). Conclusões: Neste estudo, houve associação positiva entre AME e RNPT do sexo feminino, mãe amamentar maior tempo anteriormente, não utilizar chupeta, mamadeira e não ter dificuldades.