

## **Trabalhos Científicos**

**Título:** Prevalência De Aleitamento Materno Exclusivo Em Um Hospital Amigo Da Criança E Fatores

Que A Influenciam

Autores: MONALISA VILELA (UFSC); VANESSA CARVALHO (UFSC); DENISE PEREIRA (UFSC);

CAROLINE MENEGUZZI (UFSC); RENATA TOMAZZONI (UFSC); JÚLIA FERÁBOLI (UFSC); BÁRBARA CUNHA (UFSC); ANA CRISTINA MORAES (UFSC); MARCELLA RIBEIRO (UFSC); CAROLINE MARTINELLI (UFSC); TÂNIA MEDRANO (UFSC); SUELY

GROSSEMAN (UFSC)

Resumo: Introdução A importância do aleitamento materno para o bebê e a mãe e seus os inúmeros benefícios justificam esse estudo. Objetivos: analisar a prevalência do aleitamento materno exclusivo (AME) de crianças nascidas em um Hospital Amigo da Criança e fatores que a influenciam. Métodos: Estudo transversal e descritivo com 1168 mulheres que tiveram seus filhos na maternidade de um hospital público do sul do Brasil entre 01/01/2015 a 01/07/2016. Coleta de dados por entrevista da puérpera no Alojamento Conjunto, com variáveis sociodemográficas familiares, da gestação e parto, do recém-nascido e da amamentação. Análise: estatística descritiva, e teste t-student e qui-quadrado, considerando-se significativo p<0,05. Resultados: A prevalência de AME foi 91% e associou-se a maior escolaridade paterna (p=0,03), maior peso ao nascimento (p=0,009), maior idade gestacional (p<0,001), adequação do peso para idade gestacional (p< 0,001), gravidez bem-aceita (p=0,006), mais de 6 consultas no pré-natal (p<0.001), parto vaginal (p<0.001), ausência de intercorrências no pré-natal (p<0.001), não uso de bico de silicone, translactação ou sucção nutritiva (p<0,001). Houve associação entre orientações sobre AM recebidas no pré-natal e maior tempo de intenção em amamentar o filho. Conclusões: O AME nesse hospital amigo da criança foi 91% e associou-se a escolaridade paterna, maior peso ao nascimento e idade gestacional, peso adequado para idade gestacional, gravidez bemaceita, 6 ou mais consultas pré-natais, parto vaginal, ausência de intercorrências no pré-natal e o não uso de bico de silicone, translactação e sucção com dedo de luva. Receber orientações no pré-natal durante a gestação associou-se à intenção de amamentar o filho exclusivamente ao seio por maior tempo.