



Trabalhos Científicos

Título: Aspectos Clínicos E Terapêuticos De Um Caso Clínico De Anomalia Anorretal.

Autores: GABRIELA PEREIRA SOARES BEZERRA (FACULDADE SANTA MARIA); JOICE HOLANDA DIAS (FACULDADE SANTA MARIA); ANA LUIZA GURGEL FRANÇA (FACULDADE SANTA MARIA); LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO (FACULDADE SANTA MARIA); TAMARA CAMPOS FERNANDES (FACULDADE SANTA MARIA); EWERTON FREIRE MARQUES (FACULDADE SANTA MARIA); KATHELEEN SANTOS DANTAS LOPES (FACULDADE SANTA MARIA); SARAH FERREIRA SAMPAIO (FACULDADE SANTA MARIA); THAISE DE ABREU BRASILEIRO SARMENTO (FACULDADE SANTA MARIA)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** O ânus imperfurado é uma anomalia comum nos recém-nascidos, sendo o seu diagnóstico, através do exame físico, de suma importância para atenuar complicações que possam vir a ocorrer na criança em desenvolvimento, e reduzir a mortalidade infantil. **DESCRIÇÃO DO CASO:** Paciente do sexo masculino, 8 anos, diagnosticado tardiamente, no segundo dia de vida com anomalia anorretal alta, sendo operado com colostomia, evoluiu para obstrução por bridas aos 7 meses, necessitando de nova intervenção a qual cursou com complicações cirúrgicas. O paciente foi submetido a dilatações anais e fisioterapia perineal até 1 ano de idade. Atualmente, faz uso de enemas diariamente, apresenta infecções urinárias de repetição, refluxo vesico-ureteral, hidronefrose no rim direito e rim multicístico à esquerda, associados a incontinência dos esfíncteres anal e uretral. **DISCUSSÃO:** Dentre as alterações que podem ser encontradas durante exame-físico de uma anomalia anorretal, o paciente relatado apresentava abdome distendido, ausência de fezes nas fraldas e irritabilidade. Considerando que nessa anomalia o tratamento e o prognóstico variam conforme o tipo e os defeitos congênitos associados, no caso supracitado optou-se pela realização da colostomia em detrimento ao reparo primário, o que, no entanto, não evoluiu satisfatoriamente, necessitando de uma nova abordagem com colostomia retal. Devido à alta incidência de malformações urogenitais associadas, a presença de hidronefrose é comum, sendo diagnosticado no paciente estudado. Após tratamento cirúrgico, a morbidade da função intestinal é prevalente, o que é observado diretamente na criança, através da incontinência fecal, sensibilidade do canal anal reduzida, bem como os episódios de soiling. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O caso relatado e as publicações analisadas elucidam a importância da avaliação do períneo como parte dos cuidados de rotina em sala de parto e da detecção precoce da anomalia, contribuindo para um planejamento e abordagem cirúrgica mais eficazes e com menos complicações para o paciente e sua família.