



Trabalhos Científicos

Título: Úlcera Traumática Por Infiltração Medicamentosa Em Paciente Com Leucemia Tratada Com Gel Da Casca Da Banana Verde A 10%.

Autores: LUCAS CARILLO DE ARAUJO (UNIVÁS); ADRIANA RODRIGUES DOS ANJOS MENDONÇA (UNIVÁS); HELGA DOS SANTOS CABECEIRA (UNIVÁS); RENAN VINICIUS PINHEIRO (UNIVÁS); DÊNIA AMELIA N C VON ATZINGEN (UNIVÁS)

Resumo: INTRODUÇÃO: Úlceras traumáticas podem ser definidas como lesões causadas por agentes externos que provocam danos teciduais através de impacto, abrasão, lesão por radiação ionizante, perfuração, laceração, sucção entre outros. Considerando a ampla diversidade de lesões e suas causas, coberturas de última geração têm sido desenvolvidas e aplicadas com vistas a auxiliar e favorecer um meio adequado à cicatrização. RELATO DE CASO: Criança de 2 anos, gênero feminino, leucoderma, procedente de Congonhal MG. Diagnóstico de Leucemia Linfoblástica B comum. Em uso de Cefepime, Albendazol, Hidrocortisona, Predinisona, Vancomicina, Meropenem, além de quimioterapia. No primeiro atendimento, paciente apresentava ferida, devido a extravasamento medicamentoso, localizada na região dorsal da mão direita, com presença de exsudato serossanguinolento; fibrose por toda a ferida e área perilesional hiperemiada com pontos de necrose. A lesão apresentava 4,5 cm de comprimento; 3,7 cm de largura e 4 mm de profundidade. A paciente foi acompanhada durante 38 dias dos quais foram-se feitos 17 debridamentos seguidos de curativos com gel de banana verde a 10% até o total fechamento da ferida. Não houve complicações durante o tratamento. Utilizou-se óleo de girassol como hidratante ocasionalmente. DISCUSSÃO: A administração de quimioterápicos por via intravenosa consiste em modalidade de tratamento sistêmico de escolha para a maioria das neoplasias malignas. Uma de suas principais complicações é o extravasamento de agentes antineoplásicos para os tecidos adjacentes ao vaso canulado, podendo causar desde edema e desconforto ao paciente até injúria grave e necrose, constituindo verdadeira emergência oncológica nos casos de maior gravidade. CONCLUSÃO: Portanto, trata-se de uma intercorrência passível de prevenção, que requer o desenvolvimento de estratégias nos cuidados por parte da equipe de profissionais da saúde. Ademais, notá-se a importância de investimentos em pesquisas relacionadas a coberturas naturais de baixo custo como a Banana que ofereçam um resultado eficiente e sem efeitos colaterais na cicatrização.