



Trabalhos Científicos

Título: Correlação Entre Idade Materna E Interrupção Do Aleitamento Materno Exclusivo Em Uma População De Lactentes De Um Município Do Sul Do Espírito Santo

Autores: ALINE VIEIRA SCHARRA (EMESCAM / HIFA); CATHERINE KLEIN COLOMBIANO (EMESCAM / HIFA); DANIELA GUARÇONI MOFATI PERUTTI (EMESCAM / HIFA); JANINE PEREIRA DA SILVA (EMESCAM / HIFA); VALMIN RAMOS DA SILVA (EMESCAM / HIFA); RACHEL ALMEIDA DOS SANTOS (EMESCAM / HIFA)

Resumo: Introdução: O leite materno é preconizado como alimento exclusivo nos primeiros seis meses de vida da criança. Muitos são os fatores envolvidos na sua interrupção como: idade materna, grau de escolaridade / trabalho materno, nível socioeconômico, condições de parto, urbanização, incentivo do cônjuge e parentes. Objetivos: Descrever a prevalência da interrupção do aleitamento materno exclusivo (AME) em mães adolescentes, em relação às adultas em uma população de lactentes assistida pelo programa de Atenção Integral à Saúde da Criança em um município do sul do Espírito Santo. Metodologia: Estudo transversal, em uma amostra não probabilística de 142 crianças, entre janeiro a dezembro de 2015. A análise dos dados foi realizada utilizando uma estatística descritiva em porcentagem. Resultados: A prevalência da interrupção do AME antes dos seis meses foi de 69,7%, sendo 77,3% correspondente às mães adolescentes e 68,3% às mães adultas. Conclusão: Os dados encontrados no presente estudo corroboram estatísticas anteriores. Porém, a idade materna, como fator isolado, não é capaz de justificar os elevados índices de introdução alimentar precoce, antes dos seis primeiros meses de vida. Ainda há outros determinantes, como citado acima, a serem enfrentados para a maior adesão ao AME, e, para isso, faz-se necessário a implementação / efetivação de políticas públicas voltadas para esse foco.