Trabalhos Científicos

Título: Trombose Venosa Profunda Na Faixa Infantil

Autores: MARIANA APARECIDA PASA MORGAN (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - BELO HORIZONTE MG); HENRIQUE SAMUEL CARVALHO DE ALBUQUERQUE (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - BELO HORIZONTE MG); LARISSA DOS SANTOS (HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE MG); LAÍS MEIRELLES NICOLIELLO VIEIRA (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - BELO HORIZONTE MG); BERNADETE BARRETO DE ASSIS (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - BELO HORIZONTE MG); ANA CLARA AGUILAR MENEZES (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - BELO HORIZONTE MG); EUSTAQUIO QUINTAS DAVID (); LINAVE VIEIRA CAMPOS ROSSITER (HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - BELO HORIZONTE MG); LUANA MARTINS FONSECA DE OLIVEIRA (HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE MG); MARIANE FATIMA LADEIRA (HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE MG)

Resumo: Introdução: A trombose venosa profunda (TVP) é um evento incomum em crianças, de difícil diagnóstico, que pode postergar o tratamento ocasionando sequelas graves e até êxito letal. Geralmente esta associada a trauma, sepse, malignidades, acesso venoso central e distúrbios de coagulação. Descrição do caso: Recém nascido termo (RNT), sexo masculino, 24 dias de vida, admitido com quadro de irritabilidade, edema e endureção em coxa esquerda onde havia sido aplicada vacina para hepatite B no 4º dia de vida. Evoluiu com sinais de choque, com melhora hemodinâmica após expansão volêmica. Solicitado exames de rastreio infeccioso e iniciado oxacilina e amicacina. Realizado duplex de membro inferior esquerdo (MIE) que evidenciou trombose de veia femoral, sendo iniciado enoxaparina. Apesar da melhora da endureção e do edema, mantinha defesa nas manobras de manipulação do membro. Submetido a tomografia computadorizada (TC) de MIE, evidenciada artrite séptica e abscessos de planos profundos. Realizada drenagem de secreção purulenta de articulação coxo-femoral esquerda evidenciando *Staphylococcus aureus* no estudo microbiológico, que foi também isolado em hemocultura. Tentada transição de enoxaparina para warfarim, porém não houve controle adequado do RNI para alta hospitalar. Recebeu alta em uso de enoxaparina e acompanhamento em serviço de hematologia. Discussão: A TVP é evento raro, mas com consequências devastadoras, e diagnóstico difícil devido seus sintomas inespecíficos ou mesmo ausentes. Apresenta inúmeros obstáculos como a falta de formulações específicas, poucos estudos e dificuldade de atingir níveis terapêuticos, principalmente com antagonistas de vitamina K, na pediatria. Conclusão: É de suma importância a necessidade da suspeição por parte do pediatra, assim como se faz urgente mais estudos com foco alvos terapêuticos e monitoração da resposta ao tratamento.