Trabalhos Científicos

Título: Prurigo Estrófulo

Autores: TATIANA TITERICZ (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA CATARINA); TANIA CAMPOS (HU/UFSC); FLAVIO JOSÉ MEDEIROS MARTINS JÚNIOR (HU/UFSC)

Resumo: Prurigo estrófulo é uma reação de hipersensibilidade a antígenos da saliva de insetos. Surge nos primeiros anos de vida em indivíduos susceptíveis, com pápulas eritematosas de distribuição linear. Este paciente apresentou evolução atípica, com lesões bolhosas pruriginosas. *Relato do caso:* Pré-escolar, portador de dermatite atópica e rinite alérgica, trazido para atendimento por múltiplas picadas de inseto há 3 dias. Encontrava-se afebril, com 30 bolhas de conteúdo hialino de até 5 cm de diâmetro em pernas, de drenagem espontânea, formando-se crostas amareladas. Integridade da pele adjacente conservada, edema +/4+ em pés, pápulas eritematosas e vesículas em membros superiores e couro cabeludo. Hemograma evidenciou eosinofilia, sem leucocitose. Citologia do conteúdo das bolhas com predomínio de eosinófilos, sem desenvolvimento bacteriano em cultura e IgE sérico 654 IU/mL. Administrado Cefalexina e Hidroxizina por 7 dias, com resolução do quadro. *Discussão:* Picadas por insetos que vivem em ambiente doméstico raramente são pesquisadas de modo sistemático, logo, os estudos observacionais trazem grande parte das informações disponíveis. Na maioria dos casos, os pacientes são pouco sintomáticos e o quadro tem resolução espontânea. Quadros mais graves podem surgir em pacientes portadores de dermatite atópica.*Conclusão: *Embora o padrão bolhoso seja descrito, raramente ultrapassam-se 10 bolhas e não se sabe quais fatores estariam implicados na formação destas.