



## Trabalhos Científicos

**Título:** Alimentação Via Oral De Recém-Nascidos Na Alta Hospitalar: Um Comparativo Interno Em Um Hospital De Referência

**Autores:** MANOEL COUTINHO FILHO (HGWA); ALAÍDE PINTO BESSA (HGWA); MARIANI HERCULANO DA SILVA LIMA GIFONI (HGWA); JOCELIA MARIA AZEVEDO BRINGEL (HGWA); LUIZ DE MORAES FERREIRA JUNIOR (HGWA); JULIANA TIBURTINO DE QUEIROZ SALES (HGWA); ELEN DOS SANTOS CATUNDA (HGWA); LÍVIA KAROLINE GUIMARÃES DE ALMEIDA (HGWA); ANALICE FONTENELE SILVA CAVALCANTE (HGWA); CAROLINE SAMPAIO SOUSA (HGWA); MARIA CLAUDIA MENDES CAMINHA MUNIZ (HGWA); ADRIANA ITALA ARRUDA (HGWA)

**Resumo:** Introdução: A alimentação via oral de recém-nascidos traz enormes benefícios nutricionais, bem como diminui o risco de inúmeros eventos que podem levar à internação hospitalar. Objetivo: Este trabalho objetiva identificar a alimentação via oral dos recém-nascidos (RN) na alta em assistência neonatal fonoaudiológica. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, documental e transversal, realizada no período de janeiro a abril de 2017. Foram analisados os formulários do Serviço de Fonoaudiologia da Unidade Neonatal de um hospital de referência do período de janeiro a dezembro de 2016. Este trabalho é parte de pesquisa aprovado sob nº 017136/2015. Resultados: Em 2016 tiveram alta em via oral plena 204 RN sendo 102 (50%) provenientes do interior e região metropolitana, e 113 (55,39%) eram do sexo masculino. A via oral plena segura (VOPS) é prerrogativa para a alta hospitalar, sendo dada preferência ao aleitamento materno exclusivo (AME). 152 (74,51%) saíram de alta em AME em igual proporção em relação ao sexo, 19 (9,31%) em AM e complemento (fórmula artificial) predominando no sexo masculino, 33 (16,18%) em mamadeira. O AME prevaleceu nos recém-nascidos pré-termos extremos (RNPTX) 70 (68,63%) e o uso da mamadeira nos recém-nascidos termo (RNT) do sexo masculino 14 (13,73%). O uso da mamadeira prevaleceu na capital 21 (10,29%). Conclusão: Concluiu-se que o aleitamento materno predominou em relação as formas de alimentação de via oral segura; o aleitamento materno com complemento foi relevante no interior, e em relação ao uso da mamadeira em sua maioria eram RNs da capital.