



Trabalhos Científicos

Título: Abordagem Do Uso De Álcool, Tabaco E Outras Drogas Em Uma Unidade De Cuidados Intermediários Neonatais Canguru - Ucinca

Autores: ANA MARIA CAVALCANTE MELO (UFAL); MARIA CÉLIA SANTOS (UFAL); GABRIELA CARVALHO NOBRE (UFAL); ANDRÉA GAMELEIRA CAVALCANTE COSTA (UFAL); LARISSA CLARA VIEIRA GOES (UFAL); LARISSA GOMES DE CARVALHO TOMAZ FLORES (UFAL); CLÉSIA DAMASCENO LIMA (UFAL); SUELENN MAGALHÃES MENESES (UFAL)

Resumo: 1. Introdução Fenômenos sociais como o uso de tabaco, álcool e outras drogas (ATD) se tornam um desafio quando binômios mães-bebês são admitidos numa unidade de cuidados neonatais, nessa circunstância. O presente estudo aborda a experiência da utilização do escore de Fagerstrom para tabagistas conforme o Programa de Controle do Tabagismo do MS (PCT- MS), as intervenções sociais e o tipo de alimentação dos neonatos na alta hospitalar, durante a segunda etapa do Método Canguru - UCINCA. 2. Objetivos Conhecer a prevalência do uso de ATD entre as mães que permaneceram na UCINCA no período de julho de 2016 a junho de 2017, o percentual de mães tabagistas que receberam acolhimento, a realização de intervenções sociais e aleitamento materno no momento da alta hospitalar. 3. Métodos Trata-se de um estudo transversal e descritivo, com componente analítico, realizado através da revisão dos prontuários eletrônicos de todos os recém-nascidos (RN's) internados na UCINCA de uma maternidade de referência para alto risco no período de julho de 2016 a junho de 2017. Uma vez colhidos, os dados foram transcritos para o Excel 2013. No caso de gemelaridade, foi excluído um desses RN's por sorteio. 3. Resultados Nos 65 prontuários selecionados, observou-se que 9,2% das mães faziam uso de ATD, sendo 100% tabagistas. Entre as mães que faziam uso de tabaco, 66,6% possuíam pontuação no teste de dependência a nicotina de Fagerstrom maior que 4, configurando um grau moderado de dependência. Desse grupo, 100% receberam acolhimento de acordo com o PCT - MS, 33% intervenção social com encaminhamento para continuidade de tratamento; 50% receberam alta em aleitamento materno exclusivo. 5. Conclusão A UCINCA foi um local facilitador de intervenções de aleitamento materno e construção de vínculos mesmo diante do problema do uso de ATD. A abordagem requer treinamento da equipe e possibilita maior articulação entre os níveis de assistência.