



Trabalhos Científicos

Título: Prevalência De Desmame Precoce E Fatores Associados Em Um Ambulatório De Puericultura De Referência

Autores: MARIANA CARLEIAL FEIJÓ DE SÁ (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE); EVELINE CRUZ GARCIA (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE); LUCAS LEIMIG TELLES PARENTE (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE); RODRIGO EMMANUEL LEIMIG TELLES PARENTE (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE); TALITA SOUZA SANTANA (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE); MARIA THALYNE SILVA ARAÚJO (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE); ALÉXIA BEZERRA DE MENDONÇA (UNIVERSIDADE POTIGUAR); MARIA VALÉRIA LEIMIG TELLES (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** Trata-se de um estudo transversal retrospectivo de levantamento dos dados de prontuários, no período de fevereiro e março de 2017, para a análise de prevalência e fatores de risco relacionados ao desmame precoce do leite materno em menores de seis meses. **OBJETIVO:** Detectar a prevalência e fatores de risco associados ao desmame precoce do leite materno em um ambulatório de puericultura de referência. **MÉTODOS:** A coleta de dados foi transcrita para formulário que contemplou as dimensões: Desmame precoce e faixa etária acometida, perfil social materno, dados do parto, nascimento e alimentação. Para análise estatística utilizou-se o pacote EPINFO versão 6.0. Foram inclusos 62 prontuários. **RESULTADOS:** A amostra deste estudo constatou que a prevalência de desmame precoce se encontra elevada (70,97%) e o aleitamento materno exclusivo (29,03%) apresentou-se muito distante do recomendado. Os fatores que interferiram no aleitamento materno foram prematuridade, peso abaixo de 2,5kg e ocupação materna, como variáveis de alta probabilidade em desmamar a criança antes do sexto mês de vida. ($p < 0,05$) Não houve correlação estatisticamente significativa das demais variáveis do estudo. **CONCLUSÃO:** A baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo (29,03%), nos alerta quanto à carência de medidas que busquem promoção e incentivo da lactação e de ações de prevenção quanto aos fatores associados ao desmame precoce. Profissionais de saúde possuem o papel de serem agentes facilitadores, ajudando a mãe a adquirir segurança de amamentar seu filho, prestando orientações e assistência desde o período do pré-natal, na internação hospitalar, como na continuidade do acompanhamento em unidades básicas de saúde como em ambulatórios de puericultura referenciados.