Trabalhos Científicos

Título: Meningite Tuberculosa Na Infância: A Importância Da Anamnese

Autores: GEORGE WILSON AMORIM MELO (HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA); DANIELLE NUNES MIYASATO (HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA); SABRINA SAYURI SUZUKI (HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA); ANDRESSA MESQUITA CLEMENTE (HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA); THAIS MOREIRA COSTA (HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA); INGRID LACERDA PESSOA (HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA); CAROLINA FREITAS FERNANDES DA SILVA (HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO)

Resumo: A infecção do sistema nervoso central (SNC) pelo Mycobacterium tuberculosis tem sido apontada como uma das maiores complicações extrapulmonares da tuberculose. A faixa etária predominante é nos menores de 5 anos, com maior incidência nos primeiros meses de vida. Apresentamos o caso de H.S.S, feminino, 08 meses, que apresentou vômitos e hipoatividade por duas semanas, que culminaram com rebaixamento do nível de consciência o que fez genitora procurar serviço de saúde. Internada em leito de unidade de terapia intensiva, evoluiu com Babinski e hemiparesia a esquerda, ptose e desvio de rima à direita e apneia, optado por intubação orotraqueal. Líquor (Células 45 (93% linfomononucleados), Glicose 16, Proteínas 105, Cloro 99, PCR para vírus, Gram e Latex negativos). Demais exames e sorologias sem alterações. Tomografia de crânio normal. Previamente hígida, pré-natal adequado, nascida 37 semanas, parto cesariano (placenta prévia), peso 3080, sem intercorrências. Cicatriz de BCG presente, vacinas em atraso. Mora em casa de alvenaria, 2 cômodos e 9 moradores. Mãe de 22anos, G2P2A0, sem comorbidades, apresentava tosse há duas semanas e perda ponderal de aproximadamente 10kg em 8meses. Radiografia de tórax com cavitações múltiplas e áreas hipodensas à esquerda. Feitas hipóteses diagnósticas de Tuberculose pulmonar materna (confirmada por BAAR no escarro) e presumidamente Meningite Tuberculosa (MTB) na criança, foi iniciado esquema tríplice empiricamente, com melhora clínica, sendo extubada, com redução parcial dos déficits neurológicos. Hoje em acompanhamento ambulatorial. A prevalência da MTB nos países em desenvolvimento mantém-se alta, e a doença continua a ter uma elevada taxa de morbimortalidade entre crianças. Dentre as formas de tuberculose extrapulmonar, a do SNC é a forma mais grave e letal, cerca de 70% dos óbitos ocorrem em crianças menores de 10 anos. O diagnóstico precoce associado ao tratamento imediato são os pontos-chave para um bom prognóstico e prevenção de sequelas neurológicas.