



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Abstinência Neonatal Por Uso De Antidepressivos Maternos Durante A Gestação

Autores: ANA MARIA ALDIN (REAL HOSPITAL PORTUGUES); ÂNGELA SANTOS (REAL HOSPITAL PORTUGUES); ELAYNE URQUIZA SOARES (REAL HOSPITAL PORTUGUES); ANA CLÁUDIA FIRMINO (REAL HOSPITAL PORTUGUES); ANDREA FIREMAN (REAL HOSPITAL PORTUGUES); ANDREA PORTELA (REAL HOSPITAL PORTUGUES); ARACY BIBIANO (REAL HOSPITAL PORTUGUES); ANNY MASSAY (REAL HOSPITAL PORTUGUES); FERNANDA BARACHO (REAL HOSPITAL PORTUGUES); CLEMENTE BARACHO FILHO (REAL HOSPITAL PORTUGUES); CÉLIA MATIAS (REAL HOSPITAL PORTUGUES); JOÃO GABRIEL GOMES (REAL HOSPITAL PORTUGUES); AMANDA LOPES (REAL HOSPITAL PORTUGUES)

Resumo: Introdução: A exposição pré-natal do feto a antidepressivos é tolerada, mas eventos adversos podem ocorrer, como a síndrome de abstinência neonatal. Caso 1- Recém nascido (RN) de EMP, parto cesariano, termo. Apgar: 07/07. Peso(P)= 3.215g; perímetro cefálico (PC): 34,5cm. Mãe portadora de transtorno de ansiedade. Usava escitalopram e alprazolam. Com 22 horas de vida, em alojamento conjunto, apresentou tremores grosseiros e taquidispneia. Transferido para UTI, estado regular. Frequência respiratória (FR)=68, saturação(SatO2)=94%. Frequência cardíaca(FC)=152. Tremores grosseiros nos quatro membros, hiperativo, reflexos exacerbados, fontanela anterior (FA) normotensa. Avaliação metabólica, infecciosa, gasométrica, Eletroencefalograma(EEG) e Ressonância magnética(crânio) sem anormalidades. Ecocardiograma: hipertensão pulmonar. Iniciado lorazepam 0,3mg 12/12horas. Com 4 dias, após melhora, iniciado desmame. Porém, RN com sucção débil, irritado, tremores persistentes, episódio de hipertonia com bradicardia, optado retornar dose do benzodiazepínico por 72h. Desmame lento, suspenso aos 15 dias de vida. Caso 2- RN de ETG, termo, parto cesariano, nasceu hipotônico, líquido meconizado. Transferido em CPAP. P:3.135g, PC=36 cm, APGAR=06/08. Gestante hipotireoideia, depressiva, usava levotiroxina, escitalopram, cloridrato de trazadona, prometazina. Admitido na UTI, dispneico, acianótico, ativo. FC:110, SatO2=94%. Com 29 horas, tremores grosseiros de extremidades. Movimentação simétrica dos membros, FA normotensa, tonus adequado. Reflexos presentes, sucção débil. Manteve episódios recorrentes de tremores grosseiros de extremidades e dificuldade de aceitação oral, por tremores mandibulares. Fez Lorazepam 0,01mg/kg/dia, por 7 dias, reduzido metade da dose por mais 5 dias. Alta com 12 dias. Discussão: Transtornos depressivos graves na gestante requerem farmacoterapia. Os riscos para os bebês expostos na gestação aos antidepressivos parecem pequenos, porém, por falta de estudos, RNs necessitam vigilância. Escitalopram, droga considerada segura para gestante, raramente ocorre síndrome de abstinência. Estes pacientes apresentaram sintomatologia de intensidade e duração variadas, semelhante à literatura. Conclusão: RNs com mães usuárias de antidepressivos merecem vigilância para sintomas de abstinência.