



Trabalhos Científicos

Título: Fatores Relacionados Ao Desmame Precoce Em Uma Unidade De Saúde Da Família

Autores: NATHALIA GABAY PEREIRA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ); ANNA LUIZA MELO MACHADO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ); SAVIO ATALIBA DE LIMA PAIVA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ); JULIA NICOLAU DA COSTA CHADY (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ); CAIO CÉSAR CHAVES COSTA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ); JORGE LUIZ ANDRADE COELHO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ)

Resumo: Introdução: O aleitamento materno possui inúmeros benefícios tanto para a mãe quanto para o lactente, como nutrição e imunização do bebê até os dois anos de idade. Apesar disso, o desmame precoce ainda é uma situação recorrente, devido a diversos fatores. Objetivo: Identificar os fatores relacionados ao desmame precoce em uma unidade de saúde da família. Método: Trata-se de um estudo descritivo e transversal realizado em uma Unidade de Saúde da Família. Participaram da pesquisa 16 mulheres, maiores de 18 anos e que possuíam filhos que passaram por um processo de desmame precoce entre zero e seis meses atendidos na unidade. Estas assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da coleta de dados, realizada por meio de um protocolo próprio com dados socioeconômicos, idade, motivo e condições do desmame, preenchido durante visitas domiciliares com o agente comunitário da saúde. Resultados: Sobre o perfil das mães de crianças entre 0 e 2 anos que tiveram desmame precoce (antes dos 6 meses), observou-se maior frequência de mulheres solteiras (43,75%), entre 21 e 30 anos (62,5%), sem renda familiar fixa (56,52%), com escolaridade até o ensino médio (50%) e menos frequente em mulheres que possuem ensino superior (6,25%). Observou-se também que o fator principal relacionado ao desmame relatado foi a não produção de leite pela mãe (69%), além disso, em 56% não houve orientação médica. Conclusão: Evidenciou-se a eficiência do Programa de Aleitamento Materno Exclusivo (PROAME), uma vez que a maioria das crianças do estudo não passou por um processo de desmame precoce e era elevado o nível de informação das mães sobre o assunto. No entanto, ainda é recorrente os casos de desmame precoce, sendo necessário medidas mais eficazes de instruções para o aleitamento durante o pré-natal, e incentivo às consultas de puericultura, para acompanhamento contínuo da criança.