Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso : Tratamento E Acompanhamento De Liquen Striatum Em Ambulatório De Dermatologia Pediatrica

Autores: RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA (UNIFACISA); LUIZ FELIPE MEDEIROS ROCHA (UNIFACISA); ILLEANA MONTENEGRO MOREIRA XAVIER (UNIFACISA); HERONIDES NOGUEIRA SILVA (UNIFACISA); ADRIANE DUARTE TAVARES PALHANO (UNIFACISA); ALANA AGRA DO Ó (UNIFACISA); ADRIANA FARRANT BRAZ (UNIFACISA); SIMONE FERNANDES RAMALHO (UNIFACISA); FLAWBER ANTONIO CRUZ (UNIFACISA)

Resumo: Introdução: O líquen striatum é um distúrbio de pele inflamatório linear adquirido, assintomático e auto-limitado que afeta predominantemente as crianças. A erupção é tipicamente unilateral, envolve mais frequentemente as extremidades e segue as linhas de Blaschko em um padrão contínuo ou interrompido. O início é repentino, com progressão total ao longo de algumas semanas e resolução tipicamente dentro de 6 a 12 meses. O diagnóstico é clínico, normalmente sem necessidade de tratamento pela condição ser auto limitada. Descrição: Paciente feminina, 12 anos de idade, etnia negra, é atendida e, ambulatório de dermatologia pediatrica com quadro de lesões hipocrômicas em nádega e coxa direita há 15 dias sem outros sintomas associados. A menor relatou que já fez uso de um creme para as lesões (não sabendo especificar qual), mas sem nenhuma melhora. Na ocasião da primeira consulta, a menor apresentava-se com máculas hipocrômicas de aproximadamente 3mm de diâmetro na topografia supracitada. Diante do especto visual das lesões, aventou-se a hipótese de líquen striatum, sendo prescrito hidrocortisona creme e hidratante. No retorno ambulatorial, a paciente apresentava-se ainda assintomática, mas ainda com persistência das lesões hipocrômicas, optando-se por prescrever loção de tracrolimus (0,05%), observando-se nos retornos subsequentes, melhora progressiva das lesões. Discussão: O líquen striatus é uma doença relativamente incomum que ocorre com mais frequência em crianças do sexo feminino de 5 a 15 anos de idade. Na paciente em questão, as lesões eram compatíveis com líquen striatus albus, variante da patologia, que se apresenta principalmente em pacientes de etnia negra, tal como o caso relatado. O diagnóstico diferencial com vitiligo é importante, já que o líquen striatum é transitório. Conclusão: É notória a importância do conhecimento das lesões dermatológicas essenciais para o estabelecimento das hipóteses diagnósticas, e, tomando por base aspectos epidemiológicos e morfológicos da lesão, estabelecer a melhor terapêutica.