



Trabalhos Científicos

Título: Enurese, Incontinência Urinária, Constipação: Condições Subestimadas Na Consulta De Pediatria?

Autores: ELIANE MARIA GARCEZ OLIVEIRA DA FONSECA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); ANDREA LEBREIRO GUIMARÃES VENERABILE (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); NAJLA ROCHA XIMENES DE MENDONÇA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); YEHUDI SARDINHA MARTINS (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); PAULA GARCEZ OLIVEIRA HAZAN DA FONSECA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); ANIELA BONORINO XEXEO CASTELO BRANCO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); MARTA EVANGELHO MACHADO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); MARIA ESTELA ROCHA (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); LARISSA KARKOW PEREZ (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); LEONARDO FEIJÓ DE PAULA BARROS (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); AMANDA J. MELLO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); FELIPE ALBERTO NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); TATIANA LINO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); TAYSSA BOECHAT (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); LEONARDO BARROS (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); IXTLAN RANGEL (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); MATHEUS DE BRITO PALOMBO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); OSMAR RODRIGUES (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES); BRUNO ALBERTO CAIRES CLAUDINO (ESCOLA DE MEDICINA SOUZA MARQUES)

Resumo: Introdução: Enurese, incontinência urinária e constipação intestinal são bastante prevalentes na infância e adolescência, com repercussões importantes na vida da criança e da família, entretanto são condições frequentemente subdiagnosticadas e não tratadas. Objetivo: Estimar a distribuição de enurese, disfunção do trato urinário inferior e constipação intestinal entre os pacientes do ambulatório de pediatria de um Polo de Atenção Primária. Metodologia: Estudo transversal, realizado em indivíduos de 5 a 18 anos, dos termos de consentimento e assentimento, foi aplicado a versão validada para o português do Dysfunctional Voiding Scoring System (DVSS) para o diagnóstico de disfunção do trato urinário inferior (DTUI). A constipação foi diagnosticada de acordo com os critérios de Roma IV e a Escala de Fezes de Bristol. Os dados foram analisados utilizando-se o programa estatístico SPSS 20.0. Os dados categóricos foram descritos com valores absolutos e percentuais. Os testes de chi-quadrado e Fischer foram aplicados para verificação de associação e valor de $p < 0,05$ foi considerado estatisticamente significativo. Resultados: Foram avaliados 92 indivíduos, com idade entre 5 e 17 anos (média e mediana: 10 anos), 36 (39,1%) eram do sexo feminino. Destes 10 (10,9%) aguardavam para consulta de primeira vez e 82 (89,1%) para consulta subsequente. A enurese foi diagnosticada em 13 (14,1%) dos indivíduos, sendo em 3 (8,3%) no sexo feminino e 10 (17,8%) no masculino ($p=0,24$). A disfunção do trato urinário inferior foi diagnosticada em 21 (22,8%) e a constipação intestinal em 31 (33,7%) dos indivíduos. Apenas 01 (1%) indivíduo havia procurado o posto devido à enurese. Nenhum dos indivíduos estava em tratamento para enurese, DTUI ou constipação intestinal, mas todos referiram interesse em iniciar o tratamento. Conclusão: No presente estudo foi encontrada elevada prevalência e baixo percentual de diagnóstico e tratamento de enurese, DTUI e constipação entre pacientes pediátricos da atenção primária.