



## Trabalhos Científicos

**Título:** Torcicolo Congênito Em Lactente Jovem - Diagnóstico Diferencial Na Emergência Pediátrica: Relato De Caso.

**Autores:** LEONARDO ESTEVES CARIUS (COPA DOR - IDOR); VICTOR ALMEIDA ANDRADE (COPA DOR - IDOR); ALINE DA SILVA OLIVEIRA GOMES (COPA DOR - IDOR); VANESSA SOARES LANZIOTTI (COPA DOR - IDOR)

**Resumo:** Introdução Torcicolo congênito (TC): contratura unilateral do músculo esternocleidomastoideo que, em geral, se manifesta em recém-nascidos ou lactentes. Sua incidência é de 1:250 e sua etiologia ainda não está esclarecida. Caso Clínico E.C.S.O, feminino, 34 dias de vida, pré-natal sem intercorrências, nascida de parto cesáreo, a termo, AIG, aleitamento materno exclusivo e vacinação atualizada. Deu entrada na emergência pediátrica com aumento de volume em região cervical esquerda há 48 horas, associado a pico febril. Exame físico: área endurecida, mal delimitada, medindo 3 cm, com edema e discreta hiperemia local com linfonodos palpáveis em região cervical esquerda. Exames complementares: Ultrassonografia (USG): imagem nodular medindo 2,8 x 2,1 x 1,6 cm com ecotextura heterogênea e vascularização predominantemente central ao doppler. Hemograma e PCR sem alterações significativas. Solicitada internação e iniciada antibioticoterapia para provável adenite cervical. No terceiro dia de internação, apresentava nódulo cervical esquerdo endurecido, imóvel, indolor, 3 cm, sem sinais flogísticos. Nova USG: imagem hipoecóica fusiforme, padrão fibrilar em trajeto do músculo esternocleidomastóideo, à esquerda, linfonodos cervicais menores que 1 cm. Avaliada pela Ortopedia que, mediante achado característico na USG, diagnosticou Torcicolo Congênito, sendo suspenso antibiótico, orientada fisioterapia e alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial. Discussão Diagnóstico do TC é principalmente clínico. Crianças com este diagnóstico apresentam cabeça inclinada para o lado do músculo afetado e rodada pro lado oposto, podendo apresentar nodulação cervical pela contratura. Exames de imagem podem auxiliar na exclusão de outras causas e também confirmar contratura muscular. Diagnóstico e abordagem precoces garantem o sucesso do tratamento fisioterapêutico, que quando iniciado antes do primeiro ano, é bem sucedido na maioria dos casos. Se falência do tratamento conservador, deve-se avaliar cirurgia. Conclusão Diagnóstico de Torcicolo congênito é eminentemente clínico e seu conhecimento é fundamental para se suspeitar do diagnóstico como no caso descrito.