38º Congresso Brasileiro de Pediatria
DE 10 A 14 DE OUTUBRO - FORTALEZA/CE
Eu pediatra cuidando do futuro do Brasil

Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Hiperplasia Adrenal Congênita (Hac) Forma Perdedora De Sal Diagnosticada Em Uma Emergência Pediátrica

Autores: CAMILA FERRER CARVALHO DOS SANTOS (IPPMG - UFRJ); MARIANA WERNECK COSTA (IPPMG - UFRJ); DAYSE AFFONSO (IPPMG - UFRJ)

Resumo: INTRODUÇÃO : O objetivo deste relato é destacar que a hiperplasia adrenal congênita (HAC) forma clássica perdedora de sal, pode se manifestar mais tardiamente, apesar de pouco descrita , devendo ser lembrada nas emergências inclusive após o período neonatal. DESCRIÇÃO DO CASO: Lactente, de 4 meses, masculino, procura emergência com quadro respiratório associado a hiporexia ,vômitos e com pele difusamente moteada ao exame. Relato de internação recente por quadro semelhante,recebendo alta com antibioticoterapia e prednisolona oral por 5 dias com melhora clínica. Exames laboratoriais: Sódio: 127 mEq/L e Potássio:6,6 mEq/L. Iniciados prednisolona e fludrocortisona durante internação com melhora clínica e laboratorial. Diagnóstico confirmado durante internação com 17- alfa -hidroxiprogesterona (17 OHP) : 16.000. DISCUSSÃO: A crise adrenal, caracterizada por hipovolemia, hiponatremia,hipercalemia e possível evolução para choque, por ocorrer na maioria das vezes nas primeiras semanas de vida, pode ser subestimada quando não tão precoce, principalmente quando inicia de forma branda, dificultando o diagnóstico. No feto masculino, a formação de uma genitália externa geralmente normal ao nascimento dificulta ainda mais o diagnóstico, que acaba dependendo de manifestações clínicas graves, quando muitas vezes o choque é evidente. O Teste do Pezinho como triagem é de extrema importância já que evita erros da definição sexual e impede que esse diagnóstico dependa de um cenário de emergência , com risco de vida para a criança. CONCLUSÃO: Um cenário de HAC pode não ser tão claro, principalmente quando de início tardio e no sexo masculino, mas precisa ser lembrado nas emergências possibilitando que seja instituído o tratamento imediato e reversão do quadro.