



Trabalhos Científicos

Título: Adolescente Diagnosticado Com Sapho

Autores: RAISSA MARQUES CVALCANTE (HUWC); CLARA SAKER SAMPAIO (HGWA); LARISSA ROCHA CAVALCANTE (HUWC); RAQUEL PONTE LISBOA (HUWC); LARA MESQUITA PINTO (HUWC); RAFAELLA MOUSINHO DE SÁ (HUWC); ALICE DA SILVA MEDEIROS (HUWC); PATRICA COSTA AZEVEDO ARAUJO (HUWC); SAVINA DAMASCENO GONÇALVES CORDEIRO (HUWC)

Resumo: Introdução: A sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteite (SAPHO) resume um grupo de doenças crônicas que recidivam envolvendo distúrbios musculoesqueléticos inflamatório, sinovite, hiperostose e osteíte, que pode ou não estar associado a pele neutrofílica, pustulose palmoplantar e acne conglobata. É uma doença rara e poucas séries foram publicadas. A RNM tem papel importante no diagnóstico quando correlacionada com os achados do exame físico. A terapêutica não está bem definida, antibióticos para erradicar acnes, um agente causal suspeito, bisfosfonatos quando há predominantemente acometimento ósseo, modificadores de doenças, particularmente metotrexato e produtos biológicos em formas refratária. Há relatos na literatura de complicações neurológicas e cronicidade das lesões. Descrição do caso: Adolescente, 16 anos, iniciou um quadro de acne em região torácica anterior e ombros evoluindo com dor em região lombar importante que limitava o movimento e a deambulação. Foi internado para investigação evoluindo com dores em nádegas, teste de FABERE positivo, dores em região toracolombar, sem febre e com provas inflamatórias alteradas. Realizou-se RNM de sacroilíaca sugestiva de sacroileíte assimétrica. TC de torax anterior sugerindo processo inflamatório da articulação costovertebral. Foram excluídas causas infecciosas ou neoplásicas com biópsia de articulação sacroilíaca. Evoluiu com melhora após o uso de AINE, recebendo alta assintomático para acompanhamento ambulatorial com a reumatologia, realizou pulso com pamidronato tendo boas respostas quanto às recidivas. Discussão: O relato aborda um adolescente com dor óssea em esqueleto axial associada a acne conglobata, fazendo o diagnósticos diferenciais e a necessidade de exclusão de doenças infecciosas ou neoplásicas para permitir o tratamento adequado da síndrome, ainda controverso. Conclusão: O diagnóstico de SAPHO se faz necessário que ocorra de forma precoce, evitando progressão da doença, suas complicações bem como estado algico prolongado do paciente. Além de reduzir o uso de drogas e efeitos colaterais das mesmas quando essas são direcionadas para diagnósticos não acertados ao não pensar na síndrome descrita.