



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Antropométrico De Recém-Nascidos Prematuro Em Seguimento Ambulatorial De Uma Maternidade De Referência Em Fortaleza - Ce

Autores: LUSYANNY PARENTE ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ); CAROLINE DINIZ NAZARETH (MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND); CRISTIANE SOUTO ALMEIDA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ); ANA VANESKA PASSOS MEIRELES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ)

Resumo: Introdução: O estado nutricional ao nascer é influenciado pelas condições de vida intrauterina às que este foi submetido. O peso e o comprimento adequado influenciam de forma significativa na morbimortalidade do recém-nascido (RN). Objetivo: Determinar o perfil antropométrico de recém-nascidos prematuros (RNPT) em seguimento ambulatorial de uma Maternidade de referência em Fortaleza – CE. Métodos: Realizou-se um estudo transversal descritivo, no período de março a junho de 2017, com 48 RNPT que foram encaminhados para seguimento ambulatorial. Coletou-se das fichas de atendimento: sexo, idade gestacional de nascimento (IG) e peso ao nascer. Os dados antropométricos foram aferidos pela equipe de enfermagem da Maternidade. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da referida Maternidade (CAE 64821317.0.0000.5050). As mães do RNPT assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Avaliou-se 31 (64,6%) RNPT do sexo masculino e 17(35,4%) RNPT do sexo feminino, destes 44 (91,6%) nasceram entre 32 e 37 semanas e 4(8,4%) nasceram entre 28 e 32 semanas, RNPT tardio e RNPT moderado, respectivamente. Quanto ao peso ao nascer (PN): 6(12,5%) nasceram com peso insuficiente, 38(79,1%) baixo peso e 4(8,4%) muito baixo peso. Já quanto a peso X semana gestacional: 5 (10,4%) foram classificados como pequeno para idade gestacional (PIG), 42 (87,5 %) adequado para idade gestacional (AIG) e 1(2,1%) grande para idade gestacional (GIG). Conclusões: Como esperado, a maioria dos RNPT que foram encaminhados para o seguimento ambulatorial nasceram com o peso abaixo do esperado, sendo este insuficiente, baixo peso ou muito baixo peso. Apesar do baixo peso, um número significativo (87,5%) destes nasceram com peso adequado para idade gestacional.