



## Trabalhos Científicos

**Título:** A Epidemiologia Dos Bancos De Leite Humano Do Norte Do País Em 2016

**Autores:** JULIA NICOLAU DA COSTA CHADY (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ); ANNA LUIZA MELO MACHADO (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ); ANA KARINA COROA VASCONCELOS (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); DANIELA CEZANA COVRE (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); IVAN DIAS NETO (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); LORENA COELHO DE MATTOS (CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PARÁ); MARCELO OLIVEIRA MAGALHÃES (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); MARCO AURÉLIO CORREIA MARTINS (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); MARINA LOPES FREITAS FREIRE (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); NATÁLIA TAVARES CARVALHO (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); NATHÁLIA JUCÁ DE AZEVEDO PICANÇO (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); OSIAS PIMENTA NUNES FILHO (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); THAIS OLIVEIRA SANTOS (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA); YANKA RAFAELA DA COSTA NETO VIEIRA (FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA)

**Resumo:** Introdução: O Banco de Leite Humano (BLH) foi fundado no Brasil em 1943. O intuito da implantação, originalmente, era a coleta do leite, considerado fundamental em decorrência de suas propriedades farmacológicas. Objetivos: Analisar e comparar a epidemiologia dos Bancos de Leite Humano da região Norte do país. Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, desenvolvido com dados obtidos pela Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano referente ao ano de 2016. Resultados: O norte do Brasil possui 25 BLH distribuídos em 7 estados da federação que compõe a região. No ano de 2016, os BLH coletaram 13.796,9 litros de leite, entretanto após o cumprimento dos protocolos de segurança, apenas 10.943,7 litros foram distribuídos. O mês com maior quantidade de leite humano coletado foi julho, no entanto, o mês de outubro obteve maior número de doadoras. O estado do Pará foi responsável pela maior quantidade de coletas de leite, totalizando 4.905,8 litros, seguido do Estado de Tocantins com 2.526 litros. O destaque quantitativo do Pará é devido, principalmente, a distribuição desigual dos BLH, visto que o estado do Pará possui 5 BLH, enquanto Amazonas e Tocantins possuem três e Acre, Amapá, Rondônia e Roraima apenas um. Conclusão: Alguns BLH do norte do país precisam crescer quantitativamente, entretanto todos atendem com excelência os bebês que necessitam de doação de leite, em especial, os casos que fogem do esperado, como prematuridade, distúrbios nutricionais e, até mesmo, alergias a proteínas heterólogas.