



Trabalhos Científicos

Título: Neuroblastoma: Um Diagnóstico Diferencial De Dor Abdominal Recorrente Em Crianças – Relato De Caso

Autores: MONICA NINETH PACHECO ZENTENO (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - HRCL); CARLA BIANCA DA SILVA SANTOS (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - HRC); RAFAELA BARBOSA DA SILVA SANTOS (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - HRC); PAULO FERNANDO BRASIL JUNIOR (HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL - HRC); GANDHI ROCHA CAMPOS (FACULDADE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL - FACIMED); JOÃO ANTONIO VERONESE LEME (FACULDADE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL - FACIMED)

Resumo: INTRODUÇÃO: Este trabalho tem como objetivo relatar o caso de neuroblastoma em criança com dor abdominal recorrente (DAR). Descrição do caso: Paciente VHPM, 3 anos, com história de dor abdominal há três meses, associada à prostração, claudicação, febre intermitente, e emagrecimento de 8,8% do peso basal. Na Admissão em nosso serviço, já havia realizado investigação com hemograma, EAS, urocultura e ultrassonografia (USG), dentro do padrão de normalidade. Foi iniciado nova investigação com USG de abdome, Tomografia (TC) de abdome evidenciando massa expansiva em polo superior renal esquerdo, com áreas de perneio e calcificações, linfonodomegalia retroperitoneal deslocando anteriormente a veia renal esquerda, cintilografia óssea, aspirado e biópsia de medula óssea (MO). Iniciado tratamento quimioterápico. Discussão: A origem da dor abdominal é complexa, mas de modo geral, as doenças orgânicas são identificadas em 10% das crianças com DAR. Os sinais de alarme que sugerem dor abdominal orgânica são: idade de início antes de quatro anos, perda de peso, febre recorrente, dor longe do umbigo, dor que desperta a criança do sono, recusa alimentar em função da dor, sangramento gastrointestinal. O neuroblastoma é um tumor originário do sistema nervoso simpático, que apresenta uma ampla variedade clínica, sendo a mais comum uma massa abdominal, que pode causar efeito de massa, ocasionando dor abdominal e distensão. Nesse caso tivemos dor abdominal com sinais de alarme, sugerindo doença orgânica, durante a investigação, diagnosticado um tumor de suprarenal esquerda, metastático para MO e múltiplos ossos. Conclusão: O neuroblastoma possui um quadro clínico inespecífico e de apresentação variada. É necessário incluí-lo em seus diagnósticos diferenciais de dor abdominal recorrente e na suspeita clínica, iniciar sua investigação com exames de imagem.