



Trabalhos Científicos

Título: Doença De Kawasaki Atípica E Hérnia De Morgagni Em Criança Portadora De Síndrome De Down

Autores: ANA BALESKA RODRIGUES (PRONTOMED INFANTIL), RAISSA LUA RODRIGUES CARVALHO ARAÚJO (PRONTOMED INFANTIL), BRENDA DE JESUS MORAES LUCENA BARROS (PRONTOMED INFANTIL), DÉBORA FIGUEIREDO NERY (PRONTOMED INFANTIL), KETLIN LEAL DE MOURA SANTOS (PRONTOMED INFANTIL), BEATRIZ ALVES MELO (PRONTOMED INFANTIL), FRANCISCO ROGÉRIO DE ARAÚJO MELO FILHO (PRONTOMED INFANTIL), RAYRON ALVES DE CARVALHO (PRONTOMED INFANTIL), YANDRA ARIANE GOMES LIMA (PRONTOMED INFANTIL)

Resumo: INTRODUÇÃO: Doença de Kawasaki é uma vasculite que acomete pequenos e médios vasos com predileção pelas artérias coronárias. A hérnia de Morgagni constitui-se de um defeito diafragmático raro, podendo ocasionar pneumonias de repetição. Este trabalho visa relatar o caso clínico de uma criança com Doença de Kawasaki atípica e Hérnia de Morgagni, discutindo assim sobre as patologias, seus tipos, e principais consequências. RELATO DE CASO: Lactente, 1 ano e 5 meses, portadora de síndrome de Down apresenta febre por 7 dias associada a tosse, conjuntivite bilateral não exsudativa, adenomegalia cervical, lábios fissurados, língua em framboesa, exantema polimórfico, dactilite em 5º pododáctilo esquerdo. Nos exames laboratoriais: leucocitose e aumento de provas inflamatórias. Ecocardiograma: sem sinais de cardite. Tomografia de tórax: presença de hérnia de Morgagni e broncopneumonia. A mesma foi medicada com ceftriaxona e oxacilina por 10 dias, ácido acetilsalicílico e gamaglobulina dose única evoluindo afebril com melhora clínica e agendamento pela cirurgia pediátrica para posterior correção de hérnia diafragmática. DISCUSSÃO: A Doença de Kawasaki é a causa mais comum de cardiopatia adquirida na infância. Quando não fecha critérios pode ser classificada como atípica ou incompleta. O tratamento específico da fase aguda consiste em diminuir o processo inflamatório na parede coronariana sendo realizado com imunoglobulina intravenosa e ácido acetilsalicílico. A hérnia de Morgagni é um defeito diafragmático congênito raro. Está associada com a Síndrome de Down em aproximadamente 20 dos casos. O tratamento é cirúrgico. CONCLUSÃO: Uma vez que o Kawasaki atípico esteja relacionado à maior gravidade e sequelas cardíacas que a doença clássica seu diagnóstico e tratamento precoce devem ser instalados prontamente. Quanto a Hérnia de Morgagni deve ser tratada cirurgicamente de modo a evitar complicações clínicas importantes, como pneumonias de repetição.