



Trabalhos Científicos

Título: Granuloma De Jacquet: Relato De Caso

Autores: CAROLINE DE PAULA CASSÂNEGO (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), NÁDIA BERTECHINI SOLER LOPES (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), BRUNA DINIZ NEIVA GIORGENON (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), DANIEL ALBIERO PIÉLAK (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), MARINA KOTTWITZ DE LIMA (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), MARINA FABÍOLA RODOY BERTOL (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), AMANDA ADORNO FERRAGINI (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), MILENE MORAIS SEDREZ ROVER (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), FERNANDO CÁRITAS DE SOUZA (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), HIROFUMI UYEDA (UNIOESTE, CASCAVEL, PR), MARCOS ANTÔNIO DA SILVA CRISTOVAM (UNIOESTE, CASCAVEL, PR)

Resumo: INTRODUÇÃO: Mais da metade dos lactentes sofre de dermatite das fraldas, uma reação inflamatória de apresentação variada, a qual é causada principalmente pelo atrito e maceração, exclusivamente nas áreas cobertas pela fralda. DESCRIÇÃO DO CASO: JOW, 2 anos, sexo feminino, procurou atendimento por leucorreia em moderada quantidade, dor e eritema em genitália externa há 12 dias, associada a prurido e há 2 dias piora do quadro. Na semana anterior havia sido encaminhada a serviço de infectologia, pela mesma queixa, por suspeita de abuso. Mãe relatava uso de fraldas somente à noite. Ao exame, condições precárias de higiene, lesões ulceradas anelares em vulva e entre grandes e pequenos lábios, simétricas, indolores, bordas regulares e elevadas, fundo limpo e hiperemiado, sendo diagnosticada com granuloma de Jacquet. Hímen íntegro. Sem história de infecções congênitas. DISCUSSÃO: As fezes são os agentes mais relacionados à dermatite das fraldas, pela ação das enzimas, sendo a infecção por *Candida albicans* um agravante frequente (até 77 dos casos). O granuloma de Jacquet é uma forma incomum e grave da dermatite, que ocorre pela permanência do agente causador. São pápulas salientes, vermelho escuro, que evoluem para úlceras ovais, rasas, simulando um condiloma sifilítico. Acomete principalmente região de nádegas e coxas. Deve ser diferenciada de psoríase, dermatite atópica, candidíase, sífilis, granuloma glúteo infantil, herpes, entre outros. É menos frequente atualmente, pela redução do uso de fraldas de pano, que aumentam a umidade e fricção local. A melhor medida terapêutica é manter a criança sem fraldas, fazer a higiene mais frequente, sem agentes irritantes. Em caso de associação com *Candida*, usar pomada de miconazol ou nistatina creme. CONCLUSÃO: O Granuloma de Jacquet, por ser menos frequente com as condições de higiene atuais, deve ser lembrado no diagnóstico diferencial nos quadros de úlcera genital. Abuso sexual deve sempre ser pesquisado.