



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome Da Polipose Juvenil: Relato De Caso

Autores: JULIA SCHWARTZ (UNIVILLE), VITÓRIA DA SILVA BELLI (UNIVILLE), ALINE DENISE HANAUER (UNIVILLE)

Resumo: A Síndrome da Polipose Juvenil é caracterizada pela presença de pólipos intestinais juvenis do tipo hamartomatoso, e confere risco aumentado para o desenvolvimento de neoplasias gastrointestinais. E. P., 9 anos, foi encaminhado para o pronto-socorro devido a dor abdominal crônica associada a hematoquezia intermitente, anemia em tratamento há mais de 3 anos, e diagnóstico, a partir da colonoscopia, de retocolite ulcerativa inespecífica. Diante do quadro, foi iniciado Mesalazina 800 mg e suplementação com sulfato ferroso 300 mg. Durante o seguimento, permaneceu com dor abdominal intensa e evacuações frequentes com sangue. Na colonoscopia de controle, foram visualizados pólipos pediculados e sésseis difusamente, que demonstraram pólipos juvenis típicos na biopsia. Já a tomografia computadorizada de abdome contrastada corroborou com a hipótese de doença inflamatória intestinal. Sendo assim, adicionou-se Azatioprina e foi proposto controle colonoscópico a cada 4 meses. Entretanto, evoluiu com quadro flutuante e houve piora progressiva dos sintomas ao longo dos meses e tratamento. Diante disso e dos achados nos exames de imagem, optou-se por colectomia subtotal com enteroanastomose ileosigmoidea. Paciente recebeu alta no décimo primeiro dia de pós-operatório. Permaneceu com tratamento imunossupressor e obteve melhora da sintomatologia. De acordo com a análise anatomopatológica, o quadro trava-se a Síndrome da Polipose Juvenil. A síndrome da polipose juvenil se caracteriza clinicamente por anemia, sangramento retal indolor, diarreia, dor abdominal e desnutrição, quadro semelhante ao descrito no caso. Além disso, o diagnóstico é realizado a partir do preenchimento de critérios clínicos, que consistem na existência de pólipos juvenis descritos como pólipos hamartomatosos na análise histopatológica. O seguimento desses pacientes deve ser realizado com colonoscopias periódicas, a fim de diagnosticar precocemente neoplasias. Devido ao risco aumentado de desenvolvimento de neoplasias no trato gastrointestinal, o diagnóstico precoce da Síndrome da Polipose Juvenil e acompanhamento periódico deve ser instituído o mais precocemente possível.