



Trabalhos Científicos

Título: O Uso De Chupetas Em Lactentes E A Incidência De Diarreia Em Uma Instituição Filantrópica De Aracaju

Autores: NAIANA MOTA ARAUJO (UNIVERSIDADE TIRADENTES), CAROLINY BIASUZ FARO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), EDIZIA FREIRE MORORÓ CAVALCANTE TORRES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), RAFAELLA CASTRO GAMA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), FÁBIO AUGUSTO DE MORAIS PRADO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), HUGO RAPHAEL RESENDE CRUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), JÉSSICA TELES SANTANA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), IZABELLA VASCONCELOS DE MENEZES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), GABRIELLA VASCONCELOS DE MENEZES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), LUANA ARAGÃO REZENDE (UNIVERSIDADE TIRADENTES), IANNE ALMEIDA SANTOS SILVA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), ANA CECÍLIA DE MENEZES NÓBREGA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), GABRIELLA MELLO RUSCIOLELLI NUNES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS NETO (UNIVERSIDADE TIRADENTES), LARISSA MARIA CARDOSO LIMA RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), MARIA ALICE MENEZES MOURA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), MIRELLY GRACE RAMOS CISNEIROS (UNIVERSIDADE TIRADENTES), VITORIA ADALGISA BARRETO SOUZA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), VIVIAN FERNANDES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), IZAILZA MATOS DANTAS LOPES (UNIVERSIDADE TIRADENTES)

Resumo: Introdução O uso de chupetas em lactentes está associado ao desmame precoce e à redução das taxas de aleitamento materno exclusivo (AME) em crianças entre 1 a 24 meses. A interrupção do AME, além de reduzir a interação do binômio mãe-criança, apresentar confusão de bicos, também predispõe os lactentes a uma gama de infecções, sendo a gastroenterite associada a diarreia uma das principais. Objetivos Avaliar o uso de chupetas em lactentes e a incidência de diarreia em uma instituição filantrópica de Aracaju no período de janeiro a abril de 2019. Metodologia Estudo transversal, prospectivo, analítico e descritivo, por aplicação de questionários formulados com dados relevantes da literatura e aplicados aos acompanhantes dos recém-nascidos e lactentes de 0 a 12 meses atendidos na Urgência. Este estudo foi aprovado no CEP da Universidade Tiradentes em 10 de maio de 2019. Resultados Do total de 131 questionários obtidos, a idade média dos recém-nascidos e lactentes foi de 5,2 meses, com um tempo médio de AME de apenas 2 meses. Em relação ao uso da chupeta, 51,1 (n = 67) dos lactentes faziam uso. Quanto aos motivos de procura da Urgência, a diarreia ocupou o quarto lugar com 13,7 dos casos, sendo a segunda maior causa no ranking de internações hospitalares, com 5,3. Conclusão No presente estudo, 51 dos lactentes eram usuários de chupeta e a grande maioria iniciou o uso logo no primeiro mês de vida, entretanto não foi encontrada uma relação significativa entre o uso de chupeta e a ocorrência de diarreia, estando em concordância com os estudos realizados por Younis et al. (2017) e Victora et al. (1994).