



Trabalhos Científicos

Título: Impacto Do Alerta Amarelo Sobre A Idade De Diagnóstico E Evolução De Pacientes Com Atresia Biliar Submetidos À Cirurgia De Kasai

Autores: GUILHERME MANTELATO GARCIA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), AMIRA KHEIREDDINE SALEH (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), JOEMIR JABSON DA CONCEIÇÃO BRITO (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), ULLY SUZANO DE BRAGANÇA (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), RAQUEL DE CASTRO SIQUEIRA TOGNI (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), ADRIANA MARIA ALVES DE TOMMASO (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), MARIA ANGELA BELLOMO BRANDÃO (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), ROBERTA VARARI ALCANTARA (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP), GABRIEL HESSEL (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP)

Resumo: INTRODUÇÃO: A Atresia biliar (AB) é uma doença grave sendo a principal indicação de transplante hepático em pediatria. O tratamento inicial é a cirurgia de Kasai que apresenta melhor resultado se efetuado antes de dois meses de idade. OBJETIVO: Analisar o efeito das ações do Alerta Amarelo sobre a idade de admissão, idade da cirurgia e evolução de pacientes com AB. MÉTODOS: Foi um estudo observacional, retrospectivo e analítico. Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com a época de admissão: Grupo A (n = 53), admitidos antes de 2010 e Grupo B (n = 26), de 2010 a 2018, período em que está em vigor as ações do alerta amarelo. Foi considerado como fluxo biliar efetivo se após 6 meses da cirurgia, a bilirrubina fosse menor que 2mg/dL. Os testes empregados foram de Mann-Whitney e Qui Quadrado. O nível de significância foi de 5. RESULTADOS: A média de idade da primeira consulta no grupo A foi de 90,92 dias e, no grupo B, de 86,03 dias, a média de idade da cirurgia de Kasai foi de 98,91 dias no grupo A e 90,69 dias no grupo B e essas diferenças não foram significativas. As médias dos valores das enzimas hepáticas, bilirrubina total e RNI na admissão não foram diferentes entre os grupos. A média da bilirrubina total no grupo A seis meses após a cirurgia de Kasai foi de 5,63 mg/dL e no grupo B foi de 6,24 mg/dL sem diferença significativa. No grupo A houve fluxo biliar efetivo em 40 e no grupo B o fluxo efetivo foi de 58 sem diferença significativa. CONCLUSÃO: Não houve efetividade das ações do programa Alerta Amarelo sobre a idade do diagnóstico, idade da cirurgia e fluxo biliar em pacientes com AB submetidas à cirurgia de Kasai.