Trabalhos Científicos

Título: Relato De Caso: Lactente Com Manifestações Cutâneas Bolhosas Por Chikungunya

Autores: MARINA PERIM VÁSÁRHELYI (FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS), MARINA ARAÚJO ZULCHNER (FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS), MARINA FERNANDES KLEM (FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS), MATHEUS DE BACKER VITÓRIO (FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS), TACIANE RACHID GRIMALDE OLIVEIRA (FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS)

Resumo: INTRODUÇÃO A chikungunya é uma doença febril aguda caracterizada por variadas manifestações clínicas e de letalidade ainda pouco conhecida. Deve ser lembrada como diagnóstico diferencial de lesões de pele, como a que será apresentada nesse relato de caso. RELATO DE CASO Masculino, 5 meses, trazido a emergência apresentando febre e tosse há 4 dias. Paciente taquipneico, prostado, hipocorado e com sinais de desidratação. Na internação iniciou-se tratamento para pneumonia. Exames laboratoriais evidenciaram aumento das transaminases e anemia. No 2º dia, paciente evoluiu com úlceras aftosas em cavidade oral e lesões cutâneas bolhosas em membros inferiores que não apresentavam sinais flogísticos. Há história epidemiológica para chikungunya. Após retirada de antibioticoterapia, houve regressão da lesão, sugerindo característica de um dos tipos de manifestação epidérmica da doença viral. Após 11 dias de progressão, IgM para Chikungunya confirmou-se reagente. DISCUSSÃO O vírus Chikungunya é classificado como enzootico e transmitido pelo mosquito Aedes. Sua clínica é marcada por febre e dores nas articulações, por vezes debilitante. Outros sintomas incluem mialgia, cefaleia, prurido, náusea e erupções cutâneas e mucosa, que podem ser identificadas com choro persistente e irritabilidade, sendo confundidos com outros quadros infecciosos febris, próprios da faixa etária. Manifestações bolhosas epidérmicas, como as do caso, surgem em 50 das vezes, no 1º ou no 4º dia, mais comumente em crianças menores de 06 meses. Suas lesões variam de exantemas, bolhas, pústulas e descamações, nem sempre acompanhadas de inflamação, gerando dúvidas da real patologia e fazendo diagnóstico diferencial com stafilococcias, celulites, erisipelas e síndrome de Guillain-barré. CONCLUSÃO: A Chikungunya pode causar diferentes lesões, as formas bolhosas acometem comumente bebês menores de dois anos, dentre eles apenas 50. Crianças nessa faixa etária merecem atenção para evitar maiores complicações em outros sistemas e infecção secundária.