



Trabalhos Científicos

Título: Manifestação De Chikungunya Em Lactente Jovem

Autores: MARIANA AGUIEIRAS DE CASTRO BARRETO (HEAPN), ANA PAULA RODRIGUES LAZZARI AMÂNCIO (HEAPN), CARLOS EDUARDO MOURA GOULART (HEAPN), TATIANA BERG MOURÃO TEIXEIRA BERGAMIN (HEAPN), ALINE PALMA ALVAREZ (HEAPN), CLAUDIA FALCONIERI (HEAPN), DOMINIQUE VIEIRA CAMPOS RIBEIRO (HEAPN), AYLÁ CRISTINA TAVARES DE OLIVEIRA (HEAPN), WILLIAM TAVARES DA SILVA MORAES (HEAPN)

Resumo: Introdução: A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. No lactente pode cursar com manifestações clínicas atípicas, muitas vezes incomuns em crianças e adultos. Descrição do caso: Lactente masculino, 5 meses de idade, previamente hígido, admitido com relato de febre por 24 horas, ficando durante dois dias afebril e assintomático. Evoluiu com irritabilidade, exantema macular difuso e, 36 horas após, início de lesões vesiculobolhosas, principalmente em membros inferiores. Não apresentou sintomas gripais. No segundo dia de internação hospitalar parte das vesículas evoluíram para manchas hiperocrômicas, de coloração acastanhada, com bordas arredondadas, similares a queimaduras de primeiro e segundo grau, sendo essa a evolução progressiva das lesões. A mãe do paciente havia apresentado febre, mialgia e lesões bolhosas aproximadamente 15 dias antes da internação. Aventada hipótese de arbovirose e devido a história familiar e epidemiológica, optou-se pela coleta sorológica materna e da criança, confirmando IgM positivo para chikungunya em lactente e IgG positivo materno. Paciente apresentou-se em bom estado geral durante todo o período de internação, sem picos febris. Não apresentava artralgia ou dor ou manipulação das lesões durante exame físico, evoluindo com melhora clínica e regressão das bolhas, tornando-se assintomático. Discussão: Os sintomas mais comuns da chikungunya são febre, dores e edema articular, mialgia e cefaleia. Na faixa etária pediátrica, entretanto, é necessário atentar para diferentes formas de manifestações como choro intenso, irritabilidade e principalmente lesões cutâneas multiformes, em especial lesões vesiculosas, bolhosas e pustulosas. Conclusão: A doença por Chikungunya geralmente é autolimitada e de baixa letalidade, porém, é primordial o conhecimento de manifestações clínicas específicas da faixa etária pelo pediatra, e a inclusão da doença no diagnóstico diferencial de casos que cursam com quadro de lesões bolhosas e descamativas como estafilocócicas ou farmacodérmicas.