



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Moebius E Transtorno Do Espectro Autista Em Escolar

Autores: IZABELLA NOVO FINATTI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - LONDRINA), MARIA LUIZA FREITAS BARONE GASPARINI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - LONDRINA), LUIZA HARTLEBEN MELANI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - LONDRINA), ALINE CATARINA DALTO PINTO SAMULEWSKI (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - LONDRINA), EDMARA LAURA CAMPIOLO (PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - LONDRINA)

Resumo: INTRODUÇÃO: A Síndrome de Moebius (SM) é caracterizada por uma paralisia congênita do VII e VI nervos cranianos (NC), afetando aproximadamente 1 em 50000 a 1 em 500000 nascidos vivos. Essa síndrome resulta em uma aparência facial pouco expressiva e comprometimento de outros NC, ocasionando outros distúrbios. DESCRIÇÃO DO CASO: Escolar, 6 anos, masculino, nascido de parto cesárea por sofrimento fetal as 30 semanas de vida, pequeno para a idade gestacional e com artéria umbilical única, apresentou sucessivos episódios de crises convulsivas focais motoras e atraso global do desenvolvimento. Aos 2 anos foi diagnosticado com Síndrome de Moebius devido à paralisia facial, atrofia da musculatura lingual e ausência de mímica facial. Recentemente ao freqüentar a escola regular observou-se dificuldade de socialização, padrão de rotinas, repetição comportamental e atraso da fala e linguagem. DISCUSSÃO: a origem da SM pode estar associada a alterações que prejudiquem o fluxo sanguíneo da placenta para o feto. O comprometimento de outros NC podem levar ao estrabismo, disfagia, disfonia e atrofia de língua. Observou-se também deficiência mental que pode sugerir um envolvimento difuso do sistema nervoso, porem há poucos relatos sobre SM e autismo. CONCLUSÃO: Ao realizar uma revisão bibliográfica observou-se poucas referências que associem a Síndrome de Moebius e deficiências mentais e comportamentais.