



Trabalhos Científicos

Título: Encefalomielite Aguda Disseminada (Adem) - Relato De Caso

Autores: RAFAELA SOUZA REIS (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. TUBARÃO, SANTA CATARINA), KAREN FAVARIN (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. TUBARÃO, SANTA CATARINA), BRUNA MARTINS DAMASCENO (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. TUBARÃO, SANTA CATARINA), ARTUR FURLANETO FERNANDES (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. TUBARÃO, SANTA CATARINA), FERNANDA VIEIRA DE SOUZA (UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. TUBARÃO, SANTA CATARINA)

Resumo: A encefalopatia aguda disseminada é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, e ocorre, principalmente, em crianças. Doença rara, de difícil diagnóstico e manejo clínico. Tendo, o relato, por objetivo promover uma maior familiarização entre os sintomas e abordagem de tal patologia. T.S.T.R., sexo feminino, 11 anos, admitida no dia 11/06/2019, em Pronto-Atendimento, com queixa de febre há 1 semana e diagnóstico prévio de Pneumonia, em uso de Amoxicilina. Também apresentava cefaleia, disúria e dor lombar, evoluindo com paraparesia grau 4. Foram realizados diferentes exames, em especial, a Ressonância Magnética (RNM) de crânio e coluna que demonstrou múltiplas lesões desmielinizantes em encéfalo e medula e discreto realce leptomeníngeo. O líquido cefalorraquidiano (LCR) se mostrou turvo associado a pleocitose e proteinorraquia. Portanto, foi cessada a Amoxicilina e iniciado Ceftriaxone, Aciclovir Dexametasona, em pulsoterapia. Com melhora progressiva do quadro, no dia 22/06, paciente recebeu alta hospitalar para acompanhamento neurológico ambulatorial. A ADEM pode ocorrer após vacinação, ou infecções virais. No caso descrito, a síndrome ocorrendo seis dias após o início de um quadro infeccioso, pode ser indicada como potencial protótipo da ADEM. A associação da anamnese, exame neurológico e exames complementares levaram ao diagnóstico da paciente. Acredita-se que uma melhor resposta do quadro se deve a precocidade com que o tratamento é iniciado. Portanto, o uso de Dexametasona foi eficaz. A utilização de antibióticos e antivirais, deve-se ao difícil diagnóstico diferencial. Por fim, tal relato de caso reafirma a importância do tema, para que seja possível a realização de diagnósticos diferenciais no início do quadro e a indicação de corticoterapia precoce. Além disso, é de extrema relevância o seguimento de indivíduos com quadro clínico inicial de ADEM, visto que um segundo surto ou outras enfermidades não podem ser descartados.