



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Socioeconômico Das Mães De Crianças Anoxiadas Em Maternidade Filantrópica De Aracaju No Período De Janeiro De 2017 A Junho De 2018

Autores: IANNE ALMEIDA SANTOS SILVA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), EDIZIA FREIRE MORORÓ CAVALCANTE TORRES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), RAFAELLA CASTRO GAMA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), HUGO RAPHAEL RESENDE CRUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), FÁBIO AUGUSTO DE MORAIS PRADO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), JÉSSICA TELES SANTANA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), LUANA ARAGÃO REZENDE (UNIVERSIDADE TIRADENTES), GABRIELLA VASCONCELOS DE MENEZES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), NAIANA MOTA ARAUJO (UNIVERSIDADE TIRADENTES), ANA CECILIA DE MENEZES NOBREGA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), CAMILA MENDONÇA FRANÇA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), CAROLINY BIASUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), GABRIELLA MELLO RUSCIOLELLI NUNES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS NETO (UNIVERSIDADE TIRADENTES), LARISSA MARIA CARDOSO LIMA RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), MARIA ALICE MENEZES MOURA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), MIRELLY GRACE RAMOS CISNEIROS (UNIVERSIDADE TIRADENTES), VITÓRIA ADALGISA BARRETO SOUZA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), VIVIAN FERNANDES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), IZAILZA MATOS DANTAS LOPES (UNIVERSIDADE TIRADENTES)

Resumo: Introdução A anóxia neonatal é uma das principais causas de morbimortalidade em recém-nascidos, sendo uma síndrome de caráter multifatorial que acarreta disfunção neurológica grave. A maioria dos casos ocorre por fatores pré-natais, incluindo-se fatores maternos, sendo a menor idade materna um grande fator de risco. Objetivo Analisar o perfil socioeconômico de mães de lactentes que apresentaram anóxia neonatal em maternidade Filantrópica de Aracaju de janeiro de 2017 a junho de 2018. Métodos Estudo transversal, retrospectivo e descritivo de dados de prontuários do ambulatório de seguimento de lactentes egressos da Unidade de Terapia Intensiva neonatal. Este estudo foi submetido ao CEP da Universidade Tiradentes e aprovado dia 02/04/2019. Resultados Foram analisados 95 prontuários e incluídos na pesquisa 45. Na análise dos dados maternos, a idade das mães teve uma média de 27 anos, sendo a mínima 17 e a máxima 40 anos. As mães estudaram até o ensino fundamental (n=15) 69,1 seguido por (n=7) 16 que possuem ensino médio completo. Quanto à ocupação, apenas 27 (n=10) possui emprego remunerado, enquanto a grande maioria é dona de casa (64, n=24). Conclusão As variáveis maternas apresentadas de idade, menor renda e baixa escolaridade constituem fatores de risco para a ocorrência de anoxia neonatal. Na amostra estudada, 74 das mães não possuíam renda e 69,1 estudaram até o ensino fundamental, sendo a menor idade materna de 17 anos e a maior, 40. Estudo de Formiga, Silva e Linhares indica que idade materna menor que 19 e maior que 35 e uma baixa escolaridade podem estar diretamente associadas a maior mortalidade neonatal principalmente pela menor aderência ao pré-natal. Tais fatores de risco podem ser identificados precocemente, identificando situações que necessitam de maior acompanhamento e intervenção precoce para evitar a morbimortalidade neonatal.