



Trabalhos Científicos

Título: Perfil De Pacientes Pediátricos Diagnosticados Com Paralisia Flácida Aguda No Brasil

Autores: CLARISSA TEIXEIRA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), ADRIELE RODRIGUES SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), AMANDA FERREIRA BARBOSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), BRUNO LEONE LIMA SOUZA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), ELISANE DIAS MACIEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), FÁBIO AUGUSTO DE MORAIS PRADO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), HUGO RAPHAEL RESENDE CRUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), IAN GABRIEL MELO LIMA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), MARCELA BELLO LIMA PINTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), RUTH DANIELE PEREIRA MOTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE)

Resumo: INTRODUÇÃO: Paralisia flácida aguda (PFA) é uma manifestação clínica caracterizada por fraqueza ou paralisia e redução do tônus muscular. Tal quadro pode ser causado por doença ou trauma que afete nervos, sendo o prognóstico variável. OBJETIVO: Analisar o perfil de pacientes pediátricos diagnosticados com PFA no Brasil. MÉTODO: Foi feito estudo de coorte, retrospectivo, sobre os dados contidos no Sistema Nacional de Agravos e Notificações acerca do perfil e da evolução clínica dos pacientes pediátricos diagnosticados com PFA no Brasil, no período de 2010 a 2016. RESULTADOS: Foram registrados 3750 casos de PFA em pacientes com menos de 14 anos. A maioria dos casos de PFA ocorreu no sexo masculino (55,14) e em pacientes pardos (49,28). A faixa etária mais acometida está entre o primeiro e o quarto ano de vida, sendo registrados 1347 casos. Cerca de 63 dos casos de PFA não se relaciona com a poliomielite de acordo com critérios laboratoriais confirmatórios. Dos casos de PFA, 52,96 evoluíram para cura sem sequelas, havendo apenas 711 casos com evolução para cura com sequelas. CONCLUSÃO: Ainda é elevado o número de pacientes pediátricos com PFA no Brasil. Cerca de 19 dos casos evoluem com sequelas, o que pode prejudicar o desenvolvimento biopsicossocial nessa faixa etária e repercutir na qualidade de vida. É fundamental a manutenção da vigilância e assistência à saúde das crianças diagnosticadas com PFA.