



Trabalhos Científicos

Título: Síndrome Mão-Pé-Boca Com Impetigo Crostoso Secundário: Um Relato De Caso

Autores: CLARISSA TEIXEIRA DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), ITALO RUAN RIBEIRO CRUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), IGOR JOSÉ DA SILVA SANTANA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), KARLA YASMIM DE ANDRADE SANTANA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE)

Resumo: Introdução: A síndrome mão-pé-boca (SMPB) é infectocontagiosa de etiologia viral e acomete sobretudo menores de 05 anos. O impetigo crostoso é uma piodermite bacteriana rara em menores de 02 anos, responsável pela maioria das infecções secundárias em lesões preexistentes. Relato de caso: H.A.A, sexo masculino, 9 meses, foi admitido com história lesões maculares que evoluíram para pápulo-vesiculosas há dois dias, inicialmente em região perioral que disseminaram principalmente para mãos e pés. Os sintomas foram acompanhados de hiporexia e febre, usando ibuprofeno como fator de melhora. Negou diarreia, vômitos e irritabilidade. Referiu, ainda, ter feito uso de cutinazol e Hemoximedine, porém sem efeito clínico significativo. Ao exame físico, lactente normocorado, hidratado, ativo e colaborativo. Na pele, apresentava pontos avermelhados e pequenas bolhas com halo hiperemiado, bem como crostas melicéricas em região nasal. Na hipofaringe, foi possível visualizar úlceras dolorosas que dificultavam a deglutição. Demais sistemas do organismo sem alterações. O tratamento instituído consistiu em orientações gerais (repouso, higienização), manutenção do ibuprofeno e adição da desloratadina (xarope) e de cefalexina sistêmica. Discussão: As dermatoses são doenças prevalentes na puericultura, neste relato vale destacar a SMPB como doença viral de transmissão fecal-oral, podendo ser transmitida por via respiratória e reinfecção por lesões ativas, sendo, entretanto, autolimitada, com duração de sintomas com média de 07 dias. O Impetigo bolhoso pertencente à classe das piodermites com transmissão através do contato ou por lesões traumáticas, apresentando um quadro mais arrastado, porém com o tratamento adequado possuem alta resolutividade. Conclusão: Exantemas virais são comuns na infância, geralmente autolimitados, porém podem ser sinais de doenças sistêmicas mais importantes, bem como outras dermatoses oportunistas. Portanto, o reconhecimento precoce é uma maneira importante de prover cuidados primários. A SMPB e o impetigo crostoso são doenças benignas, que raramente evoluem com complicações.