Trabalhos Científicos

Título: Epidermodisplasia Verruciforme: Genodermatose Rara

Autores: LUIZA MIRANDA DE ARAÚJO (UCB BRASÍLIA-DF), ANA CAROLINA GOMES SIQUEIRA (UNICEUB BRASÍLIA-DF), JÉSSICA DANICKI PRADO FERNANDES (UNICEUB BRASÍLIA-DF), MATHEUS MORENO DE OLIVEIRA (UNICEUB BRASÍLIA-DF), EDUARDO JOSÉ FERREIRA SALES (UNICEPLAC BRASÍLIA-DF), ANTONELLA MÁRCIA MERCADANTE DE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO (UNICEUB BRASÍLIA- DF)

Resumo: Epidermodisplasia verruciforme (EV) é uma genodermatose rara, multifatorial e de padrão autossômico recessivo, ocorre devido à predisposição genética, imunológica e a fatores ambientais. A doença é caracterizada pela susceptibilidade à infecção por tipos diferentes tipos de papilomavírus humanos (HPV). Trata-se de um relato de caso do sexo masculino, 15 anos, apresentava queixa de verrugas disseminadas. A mãe do paciente informou que, aos três anos, surgiram pápulas e verrugas na região frontal, que disseminaram para o restante do corpo. Nega consanguinidade ou outros casos semelhantes na família. Ao exame físico havia máculas hipocrômicas em face, principalmente em fronte, confluentes, e lesões semelhantes, esparsas em membros superiores, abdome e coxas. Foi tratado com crioterapia, aplicação tópica com imiquimode, Thuya CH6, sulfato de zinco, tretinoína 0,025 creme, sem melhora. Foi introduzido fluoruracila tópica, seguindo tratamento ambulatorial em dermatologia. O quadro clínico marcante da doença são as verrugas, normalmente planas, que podem ser múltiplas, persistentes e desfigurantes. Surgem na infância ou na segunda ou terceira décadas de vida. Podem ter aspecto de máculas hipocrômicas, ou hipercrômicas ou ainda eritematosas, por vezes descamativas (semelhante a ptiríase versicolor) . Nas lesões das áreas fotoexpostas,pode ocorrer transformação maligna, como o carcinoma epidermoide in situ, quando causada pelo HPV-5. De 30 a 60 dos pacientes com EV desenvolvem alterações malignas, inicialmente nas áreas expostas a luz solar. Pacientes com EV tem maior tendência a desenvolver carcinoma epidermoide (CEC), um terço desenvolverá na idade adulta e várias décadas mais cedo do que a ocorrência típica de CEC na população geral. Pode ocorrer invasão perineural, metástases e morte. O diagnóstico precoce de EV permite que o paciente seja acompanhado de perto para detecção de transformação maligna das lesões. Como as lesões malignas ocorrerão principalmente em áreas foto-expostas, o uso de vestimentas e foto-protetores é mandatório.