



## Trabalhos Científicos

**Título:** Lesão Psoriásica Estigmatizante Em Paciente Pediátrico Responsiva Ao Tratamento Com Etanercepte

**Autores:** JOÃO VICTOR BEZERRA RAMOS (UFPB), CLARISSA GIOVANA LUNA DE OLIVEIRA (UFPB), BEATRIZ NUNES GOMES (UFPB), CHRISTIAN GIUSEPPE SANTOS ROCHA DE LIMA (UFPB), LETÍCIA REZENDE LIMA (UFPB), ELIOMAR TOMAZ DE BRITO (UFPB), ESTHER BASTOS PALITOT (UFPB), GUILHERME BASTOS PALITOT DE BRITO (UFPB), LUANA HENRIQUE LEITE (UFPB), MATHEUS MEDEIROS DE MORAIS SANTOS (UFPB)

**Resumo:** **INTRODUÇÃO:** A psoríase é considerada uma patologia cutânea inflamatória e crônica que atinge, no Brasil, cerca de 0,5 a 2 desses casos correspondente à faixa de idade infantil e adolescência. **DESCRIÇÃO DO CASO:** Paciente, 11 anos, sexo feminino com surgimento de lesões estigmatizantes em face a partir dos 5 anos de idade, diagnosticada com psoríase pelo exame histopatológico, sem antecedentes familiares. As lesões se mostravam como máculas hipercrômicas, descamativas em frente e região periorbital. Iniciou-se o tratamento com corticoide e inibidores de calcineurina tópicos, sem resposta à medicação, com dificuldade de interação social e consequente prejuízo no desempenho escolar. Após o screening foi prescrito uso oral de Metotrexato e ácido fólico sem melhora das lesões, mesmo alteradas dose e via de administração. Optou-se pelo uso do Etanercepte 0,8 mg/kg semanalmente via subcutânea com remissão da lesão cutânea na face e retorno às suas atividades sociais e educacionais. **DISCUSSÃO:** A apresentação da psoríase pode ser em qualquer fase da vida, sendo útil determinar a idade de surgimento das lesões para se prever uma doença mais agressiva e recidivante. Quando as lesões surgem durante a infância, as consequências psicológicas são mais intensas e o risco de transtornos psiquiátricos e sociais é aumentado, uma vez que essa é uma fase fundamental na construção da personalidade do indivíduo. O tratamento se torna um desafio na faixa etária pediátrica. Geralmente se prefere o uso de substâncias tópicas, como corticóides, vitamina D3 e análogos, além de inibidores de calcineurina, ou sistêmicas, como Metotrexato, mas pode ser feito uso de imunobiológicos, como nessa paciente que fez uso do anti-TNF-alfa. **CONCLUSÃO:** No caso em questão, destaca-se a psoríase de apresentação estigmatizante em face que fez uso de Etanercepte e obteve controle da doença com melhora dos prejuízos sociais causados pelas lesões de pele que a vulnerabilizava socialmente.