39º Congresso Brasileiro de Pediatria
DE 09 A 12 DE OUTUBRO - PORTO ALEGRE/RS
Vamos construir o pediatra do futuro

Trabalhos Científicos

Título: Síndrome Da Hipoplasia Do Coração Esquerdo: Relato De Sucesso Tratamento Na Amazônia Ocidental Brasileira

Autores: THAÍS NAKOUZI BAÉSSA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS), MIKAELA FELIX PINTO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS), CAROLINE DA SILVA MOTTA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS), AMANDA CAROLINE DE SANTANA FOGAÇA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS), MARALÚCIA DE SÁ MAGALHÃES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS), LESLY RAMOS MARINHO (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS), GEORGE ANDRSON BUTEL TAVARES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRANCISCA MENDES), RONALDO CASTILLO CAMARGO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRANCISCA MENDES), SUELY REGINA DA SILVA TELES (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRANCISCA MENDES), HELIANA MARIA COSTA GARCIA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRANCISCA MENDES), SAULO BRASIL DO COUTO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRANCISCA MENDES)

Resumo: As cardiopatias congênitas correspondem a 40 das malformações congênitas. No Brasil anualmente estima-se o surgimento de quase 29 mil novos casos de cardiopatias congênitas. A Síndrome da hipoplasia do coração esquerdo (SHCE) é um conjunto de anomalias cardíacas congênitas que consiste em hipoplasia importante ou ausência do ventrículo esquerdo e hipoplasia da aorta ascendente, em sua forma mais severa, ocorre atresia da válvula aórtica e mitral e ausência de cavidade do ventrículo esquerdo funcional. Relatamos o caso de um lactente de 1 ano e 3 meses com quadro de SHCE diagnosticado no período neonatal através da ecocardiografia transtorácica. Foi transferido para serviço de referência aos 30 dias de vida, sendo submetido ao primeiro procedimento cirúrgico -Norwood(com tubo Sano VD-TP,atriosseptostomia) aos 2 meses de vida e com 5 meses de vida foi realizado o segundo procedimento cirúrgico -Glenn (derivação cavopulmonar superior). Aos 9 meses de idade recebeu alta hospitalar e aguarda novo procedimento cirúrgico (Fontan) que é indicado a ser realizado entre 2 a 5 anos de idade. Vem sendo acompanhado regularmente pelo ambulatório da cardiologia pediátrica. O tratamento cirúrgico da SHCE consiste em três procedimentos, sendo o primeiro realizado durante a primeira semana de vida, com maiores taxas de sobrevida. Entretanto relatamos o sucesso deste caso mesmo que o procedimento tenha ocorrido mais tardiamente. Que se tem conhecimento, trata-se do primeiro caso de sucesso da Amazônia ocidental brasileira. Reiterando com isso, a importância do diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas visando prover intervenções para as crianças com resultados positivos.