



Trabalhos Científicos

Título: Psoríase Manifesta Pelo Fenômeno De Köebner Secundária À Exérese De Nódulo Mamário: Um Relato De Caso

Autores: LÍVIA SOUSA SCHMIDT (UNIFOR), AMANDA DE PAULA PESSÔA PAULA BOTELHO (UNIFOR), MARIA CLARA DE SOUZA VIEIRA (UNIFOR), LIA CORREIA MOREIRA (UNIFOR), CLÁUDIO PINHEIRO DIAS (HOSPITAL ALBERT SABIN), CRISTIANE RODRIGUES DE SOUSA (HOSPITAL ALBERT SABIN), LIA BEATRIZ DE AZEVEDO SOUZA KARBAGE (HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA)

Resumo: Introdução: A psoríase é uma doença imunoinflamatória caracterizada por hiperplasia epidérmica e pode surgir secundariamente ao Fenômeno de Köebner, que se caracteriza pela reprodução da lesão em locais submetidos a traumatismos diversos. Descrição do caso: Paciente feminina de 19 anos foi encaminhada a Hospital Infantil por consequência do aparecimento de nódulo de 4 centímetros em mama direita. Na Unidade, submeteu-se a cirurgia e foram retirados dois nódulos, os quais, após exame histopatológico, demonstraram benignidade. Seis meses após o procedimento, a paciente retornou ao ambulatório de Cirurgia queixando-se de dor no local da operação, associada à secreção amarelada local. Foi iniciada terapia com corticóide tópico e houve melhora, mas sem efetiva resolução. Retornou após 1 ano por persistência do quadro e foi solicitada realização de biópsia local, com laudo de Psoríase Cutânea. A paciente seguiu em acompanhamento Dermatológico e iniciou terapia com Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona associado a Dexpantenol. Houve resolução do quadro após 2 meses de tratamento. Discussão: Na psoríase, doença crônica multipatogênica, ocorre interligação entre queratinócitos e células T e depósito de anticorpos e de complemento na placa córnea da pele. Já o fenômeno de Köebner é um fator desencadeador dessa doença, principalmente, e consiste no aparecimento de lesões isomórficas em regiões de pele sadia após lesão local/trauma. Outros fatores podem induzir a exacerbação da psoríase e o aparecimento do fenômeno, como estresse e medicações. Preferencialmente, a doença atinge cicatrizes devido à alteração na vasculatura e à presença de infiltrado crônico. O tratamento consiste no bloqueio da liberação dos mediadores responsáveis. Conclusão: Apesar de pouco mencionado, o fenômeno de Köbner é um exemplo clássico na psoríase e ocorre em cerca de 1/3 dos doentes. É importante a investigação dessa doença dermatológica quando identificado tal fenômeno, que pode preceder dias ou anos o aparecimento da doença.