



Trabalhos Científicos

Título: Chikungunya Com Manifestação Articular Crônica Na Faixa Etária Pediátrica

Autores: AMANDA ATERJE PELLOSO (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO), TAIS FERNANDA PALISSARI (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO), MARIA CAROLINA DOS SANTOS (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO), SILVANA BRASILIA SACCHETTI (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO)

Resumo: Introdução: A febre chikungunya (CHIKF) é uma arbovirose, transmitida por vetores, principalmente *Aedes aegypti*. Dentre as manifestações clínicas, estão artralgia/artrite, que pode persistir por meses e comprometer a qualidade de vida do paciente. Descrição do Caso: Paciente GGAS, 14 anos e 2 meses, masculino, com história progressiva de febre de até 39°C, associada a vômito, artralgias e máculas eritematosas em todo o corpo, realizadas sorologias, confirmando o diagnóstico de infecção por Chikungunya, com IgM positivo. Após 25 dias do diagnóstico de CHIKF iniciou quadro de artrite em tornozelos, articulações interfalangeanas das mãos, joelhos, cotovelos e punhos, com rigidez matinal de 30 minutos. Optado por iniciar antiinflamatório não esteroideal (AINES), após dois meses, paciente mantinha artrite em joelhos, com rigidez matinal de 30 minutos, introduzido metotrexate (MTX). Paciente ficou assintomático após quatro meses de tratamento. Um ano após a suspensão da medicação, paciente mantém acompanhamento regular, sem artrite ou artralgia. Discussão: Nos casos de artrite, principalmente nas formas agudas, as doenças infecciosas são as principais causas, seja de forma direta ou reativa. As arboviroses devem ser investigadas, em especial a Chikungunya, pois as manifestações articulares são mais frequentes e intensas. Os estudos descrevem que o comprometimento articular pode persistir por meses após a infecção. Quanto ao tratamento, os AINES são efetivos na maioria dos casos, nos casos crônicos pode ser necessário a associação de outras medicações. Conclusão: Embora na literatura ainda existam poucos dados sobre o tema, acredita-se que cerca de metade dos pacientes com CHIKF que apresentam artrite podem manter os sintomas por meses. Entender melhor a epidemiologia, aspectos clínicos e métodos diagnósticos é essencial para o diagnóstico precoce e controle dos sintomas.