



Trabalhos Científicos

Título: Transtorno Depressivo Maior Com Sintomas Psicóticos Na Adolescência – Relato De Caso

Autores: MATHEUS SILVA MELO (UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE), TANIA MARIA SBEGHEN DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE), MARCO AURÉLIO GOULART (UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE)

Resumo: Introdução: A população adolescente é passível às condições negativas DE saúde. Dessas, os transtornos psiquiátricos TEM relevância, sendo Transtorno Depressivo Maior (TDM) retratado na literatura como um dos mais prevalentes. Os sintomas psicóticos não são comuns, quando presentes, associados À gravidade e pior prognóstico. Descrição do caso: paciente masculino, 12 anos de idade, frequentando 6º ano do ensino fundamental, procedente de Lages – Santa Catarina, comparece ao ambulatório de hebiatria acompanhado de mãe e padrasto. Relatam quadro psicótico há cerca de 1 semana, no qual o paciente, extremamente agitado, referia ouvir uma voz que o mandava se machucar, além de ver ocasionalmente um senhor idoso em terno preto com boca suturada. O paciente foi atendido no pronto-socorro pediátrico e, então, referenciado ao ambulatório de hebiatria. Durante a investigação, constatou-se anedonia e humor depressivo na maior parte do tempo, que vinham se instalando há cerca de um ano e que se intensificaram após morte do avô materno há três meses. Insônia, fadigabilidade, isolamento e pensamentos ruminativos em relação a religião contemplavam os sintomas presentes. Uso de substância psicoativa e outros transtornos orgânicos foram intensamente investigados, sendo afastadas tais possibilidades, bem como ideação suicida. Discussão: as manifestações clínicas do TDM são essencialmente as mesmas do adulto, sendo que os principais sistemas de classificação de transtornos mentais utilizam os mesmos critérios diagnósticos para todas as faixas etárias. Contudo, a sintomatologia varia de acordo com a fase da vida. Sintomas psicóticos aumentam substancialmente a morbimortalidade. Conclusão: a depressão faz parte de transformações patológicas que podem ocorrer durante a adolescência, sendo raro a presença de sintomas psicóticos.