



Trabalhos Científicos

Título: Relação Entre O Desmame Precoce E O Uso Incorreto De Fórmulas Infantis E Farináceos Em Urgência Pediátrica

Autores: GABRIELLA VASCONCELOS DE MENEZES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), RAFAELLA CASTRO GAMA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), EDIZIA FREIRE MORORÓ CAVALCANTE TORRES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), FÁBIO AUGUSTO DE MORAIS PRADO SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), HUGO RAPHAEL RESENDE CRUZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), JÉSSICA TELES SANTANA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), IZABELLA VASCONCELOS DE MENEZES (UNIVERSIDADE TIRADENTES), LUANA ARAGÃO REZENDE (UNIVERSIDADE TIRADENTES), IANNE ALMEIDA SANTOS SILVA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), NAIANA MOTA ARAUJO (UNIVERSIDADE TIRADENTES), ANA CECÍLIA DE MENEZES NÓBREGA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), CAMILLA MENDONÇA FRANÇA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), GABRIELLA MELLO RUSCIOLELLI NUNES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS NETO (UNIVERSIDADE TIRADENTES), LARISSA MARIA CARDOSO LIMA RODRIGUES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), MARIA ALICE MENEZES MOURA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), MIRELLY GRACE RAMOS CISNEIROS (UNIVERSIDADE TIRADENTES), VITÓRIA ADALGISA BARRETO SOUZA (UNIVERSIDADE TIRADENTES), VÍVIAN FERNANDES DOS SANTOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE), IZAILZA MATOS DANTAS LOPES (UNIVERSIDADE TIRADENTES)

Resumo: INTRODUÇÃO: O desmame precoce é definido como a interrupção do aleitamento materno (AM) antes dos 6 meses de idade, podendo ser influenciado por fatores biológicos, culturais, socioeconômicos e psíquicos. OBJETIVOS: Este estudo objetiva avaliar o uso incorreto de fórmulas infantis e farináceos em crianças com desmame precoce atendidas em Urgência Pediátrica de um Hospital Filantrópico de entre fevereiro a abril de 2019. MÉTODOS: Pesquisa quantitativa, prospectiva, transversal de caráter exploratório, por aplicação de questionários aos acompanhantes das crianças de 0 a 12 meses atendidas na Urgência. Aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa no dia 25/02/2019. RESULTADOS: Todas as 132 entrevistadas realizaram desmame precoce. Quanto ao tempo de AME (aleitamento materno exclusivo), 35,6 amamentaram de 1 a 2 meses, 34,9 por menos de 1 mês, 27,2 de 3 a 4 meses, e 4,5 durante 5 meses. Mais da metade (51,4) faziam uso de fórmula – dentre esse grupo, 51,4 usam erroneamente as medidas de diluição, 54,2 tiveram aprovação e orientação médica. As fórmulas mais usadas foram as de partida 95,6 seguidas pelas hidrolisadas proteicas 4,2. Quando questionadas acerca da alimentação complementar, 45,4 (n=59) utilizam gogó – 3,3 (n=2) afirmaram utilizar por prescrição médica. Observa-se que 91,7 (n=121) introduziram o uso de água, 77,3 (n=102) chá, 45,5 (n=60) suco, 43,2 (n=57) frutas e 41,7 (n=55) verduras. CONCLUSÃO: Conclui-se que, após interrupção do AM, a alimentação da criança majoritariamente permanece comprometida. Deve-se lembrar que a tolerância gastrointestinal do lactente é baixa para alimentos com alto teor de gorduras ou carboidratos, como os gogós. Além disso, a fórmula láctea deve satisfazer integralmente as necessidades do lactente, para isso necessita-se de adequada composição e volume suficiente.