



## Trabalhos Científicos

**Título:** Alergia À Proteína Do Leite De Vaca (Aplv) No Diagnóstico Diferencial De Constipação Intestinal Crônica

**Autores:** CLARA MARIA ROCHA CIPRIANO (CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI), GABRIELA MARTINS DE CARVALHO (CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI), MARIA FERNANDA MARRANGHELLO D´AMICO (CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI), FÁTIMA REGINA DE ALMEIDA PATIÑO (CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI), CAMILA SCARPELLINI LIMA RIBEIRO (CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI), RAFAEL ANDRADE FERREIRA (CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI)

**Resumo:** Introdução: A constipação intestinal crônica (CIC) é uma queixa frequente na consulta pediátrica. Lactentes que apresentam eliminação tardia de mecônio, vômitos, distensão abdominal, baixo ganho ponderal e cólicas intestinais, devem ser afastadas causas orgânicas como: Megacólon agangliônico, mal formação anorretal, APLV, hipotireoidismo, anormalidades da medula espinhal, entre outras. Descrição do caso: A.S.F.S., feminino, 1 mês de vida, com história familiar positiva para atopia, em aleitamento materno exclusivo, e mãe com ingesta alimentar sem restrições, foi internada pela Cirurgia pediátrica, por CIC e suspeita de megacólon agangliônico. Realizado enema opaco o qual mostrou apenas dolicosegmoide, sem sinais de estreitamento, sendo assim afastando esta hipótese. Discutido o caso com equipe da gastropediatria, e então aventada a hipótese de APLV. Devido o agravo nutricional da paciente foi iniciado dieta de exclusão de leite e derivados para a mãe e prescrita fórmula de aminoácidos para a paciente. Após 72 horas houve nítida melhora dos sintomas e a criança passou a evacuar sem o uso de laxantes por via retal. Discussão: A associação de CIC e APLV tem sido evidenciada com frequência em várias publicações científicas, como em Iacono G e cols, onde se observou a melhora do quadro de constipação com a exclusão de leite e derivados da dieta dos lactentes, em 68 dos pacientes. O caso apresentado reforça a importância de se buscar no diagnóstico diferencial, outras causas de CIC, pois nem todos os casos são de tratamento cirúrgico. Conclusão: Nos casos de CIC de aparecimento precoce, a APLV deve ser lembrada no diagnóstico diferencial, mesmo em crianças em aleitamento materno exclusivo.