



Trabalhos Científicos

Título: Efetividade Do Critério De Roma Iv Na Avaliação Diagnóstica De Sintomas Gastrointestinais No Lactente

Autores: MAURO BATISTA DE MORAIS (ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA-UNIFESP I SÃO PAULO – SP), MAURO SERGIO TOPOROVSKI (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO – SP), MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI (HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR JURANDIR DO NASCIMENTO – GOIÂNIA, GO), KARINA VIEIRA DE BARROS (DANONE NUTRICIA BRASIL SÃO PAULO, SP), LUCIANA RODRIGUES SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – BA), CRISTINA HELENA TARGA FERREIRA (HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO - COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA – UFCSPA, PORTO ALEGRE - RS)

Resumo: Introdução: Um dos objetivos dos critérios de Roma é padronizar o diagnóstico dos distúrbios gastrointestinais funcionais (Última versão: Roma IV, 2016). Objetivo: Relacionar as frequências de sintomas gastrointestinais em lactentes com o número de diagnósticos de distúrbios gastrintestinais funcionais estabelecidos pelo critério de Roma IV. Métodos: Estudo transversal com 5080 lactentes (idade 12 meses) incluídos no estudo durante o atendimento em consultórios particulares de Pediatria das cinco regiões geográficas do Brasil. As mães preencheram uma ficha individual com perguntas sobre a ocorrência de sintomas gastrintestinais. Resultados: Regurgitação do lactente (entre 21 dias e 1 ano) foi caracterizada, segundo o critério de Roma IV, em 11,4 (487/4270) da população estudada. Entretanto, outros 909 (22) lactentes que não preencheram o critério de Roma IV apresentavam duas ou mais regurgitações por dia. Cólica do lactente (5 meses) foi caracterizada em 6,0 (131/2174). No entanto, um grupo adicional de 565 (26) lactentes apresentava pelo menos um episódio de choro, inquietação ou irritação sem motivo aparente na última semana. Disquesia do lactente (antes de 9 meses) foi caracterizada em 4,0 (157/3895) dos lactentes, entretanto, outros 218 (6) apresentaram esforço ou choro antes de evacuar fezes moles pelo período de 5 a 10 minutos. Constipação intestinal foi caracterizada em 7,6 (341/4506) dos lactentes. No entanto, outros 605 (14) lactentes apresentavam dor para evacuar, 60 (1,3) eliminavam fezes duras e 78 (1,7) tinham dor para evacuar fezes duras. Estes 743 (16,5) lactentes não preencheram o critério de Roma IV para constipação intestinal funcional. Conclusão: Parcela expressiva dos lactentes que apresenta sintomas gastrintestinais não preenche os critérios diagnósticos de Roma IV. Estes sintomas, além do desconforto que ocasionam no lactente, podem ter consequências na dinâmica familiar e gerar gastos financeiros. Controle precoce destes sintomas pode se associar com melhor prognóstico.