Trabalhos Científicos

Título: Toxoplasmose Congênita Apresentando Calcificações Na Tomografia Computadorizada

Autores: CAROLINA BALLESTER LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), JANAINA COSSETIN (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), ISABELLA GATTO PIRES DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), GIANI CIOCCARI (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), SUELLEN CRISTINA MONTAGNA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), CAMILA COSTA SOARES (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), YASMIN MENDES DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), FERNANDA DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), NATÁLIA BENDER FUHR (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), MARÍLIA SONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), BRUNO HIDEMI TOMINAGA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), RAQUEL BUFFON (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), IURY DARON (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), BRENDA BARBETTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), VINICIUS VIECHINSKI RADAELLI (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), JÉSSICA PASQUALI KASPERAVICIUS (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS)), HENRIQUE FERNANDO PAULINO DA SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - CAMPUS PASSO FUNDO (RS))

Resumo: Introdução: As infecções perinatais afetam 0,5 a 0,25 de todos os nascimentos, sendo a toxoplasmose transmitida pelo Toxoplasma Gondii, apresentando risco de transmissão materno fetal em torno de 40, aumentando com o avançar da gravidez, chegando a 80 no terceiro trimestre. Descrição do Caso: Paciente I.R.S.A., 1 ano de idade, sexo feminino. Mãe na sua primeira gestão, sendo realizada cesárea. Relata 8 consultas de pré natal iniciadas no segundo trimestre de gestação com sorologia para toxoplasmose suscetível no segundo trimestre, soroconvertendo no terceiro trimestre, com demais sorologias negativas. Recém nascido apresentou IGM reagente para toxoplasmose, sendo realizado avaliação do liquor e tomografia computadorizada de crânio, a qual evidenciou grandes calcificações em parênquima encefálico, iniciando tratamento no dia seguinte. Discussão: 70 dos pacientes com toxoplasmose congênita são assintomáticos ao nascimento, sendo que 10 apresenta manifestação grave nos primeiros dias de vida. A doença é multissistêmica, podendo acometer o sistema nervoso e/ou apresentar-se da forma ocular, sendo a forma subclínica a mais comum. As seqüelas neurológicas mais encontradas são a hidrocefalia ou microcefalia, retardo psicomotor, convulsões, hipertonia muscular, hiperreflexia tendinosa e paralisias. Como sequelas oftalmológicas estão presentes a microftalmia, sinéquia de globo ocular, estrabismo, nistagmo e catarata. Conclusão: A toxoplasmose tem como principais fatores de risco a contaminação de fezes de gato, ingestão de leite não pasteurizado e a ingestão de carne mal cozida, sendo assim, é imprescindível que medidas de higiene sejam valorizadas afim de erradicar tal doença. Além disso, um pré natal correto e seguro garante um enorme benefício aos recém nascidos.