



Trabalhos Científicos

Título: Fasceíte Necrotizante Em Recém-Nascido: Relato De Caso.

Autores: GABRIELA CIMA MARTINS DOS SANTOS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA), BRUNA FELTRIN RICH (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA), GABRIELA RUSCHEL ZANOLLA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA)

Resumo: Introdução: Fasceíte necrotizante (FN) é uma doença potencialmente fatal, de etiologia bacteriana, rapidamente progressiva, que causa necrose da pele, tecido subcutâneo, fáscia e músculo. É incomum em pediatria. Os agentes etiológicos mais isolados são *Streptococcus pyogenes* e *Staphylococcus aureus*. O diagnóstico é clínico e o tratamento inclui desbridamento cirúrgico do tecido necrótico e antibioticoterapia parenteral de amplo espectro. Descrição do caso: Paciente masculino, 11 dias de vida, internou com nódulo e hiperemia em região mamária direita com piora progressiva há 4 dias. Iniciada oxacilina e gentamicina e desbridamento cirúrgico da lesão. Após 24 horas, mantinha sinais de necrose tecidual, realizado novo desbridamento e associada clindamicina. No 4º dia pós-operatório (PO), realizado novamente desbridamento da lesão e curativo a vácuo por 72 horas. Houve crescimento de *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina no material da biópsia da lesão. Foi suspensa oxacilina, iniciada vancomicina e mantidos demais antibióticos. No 20º PO, paciente realizou enxerto dermo-epidérmico da coxa esquerda para a região do tórax. Após 35 dias de internação recebeu alta hospitalar. Atualmente, segue em acompanhamento ambulatorial com equipe da cirurgia pediátrica. Discussão: Curso fulminante é frequente em neonatos com FN, portanto o diagnóstico precoce é essencial para a eficácia do tratamento com desbridamento cirúrgico e antibioticoterapia parenteral. Relatos evidenciam que a associação entre essas duas medidas reduz drasticamente a morbimortalidade. Esse processo começa com a seleção adequada dos antibióticos, que deve ser inicialmente empírica e poderá ser posteriormente modificada. Tanto o serviço de infectologia quanto o serviço cirúrgico devem ser envolvidos precocemente, a fim de orientar o tratamento e melhorar o prognóstico do paciente. Conclusão: A alta morbimortalidade associada aos casos de FN faz com que seja necessário a familiarização de todos os profissionais de saúde com esta doença, devido ao elevado risco resultante de um diagnóstico e terapêutica tardios.