



Trabalhos Científicos

Título: Hemangioma Cervical Em Recém Nascido - Relato De Caso

Autores: NATACHA EMI INOUE (HOSPITAL MUNICIPAL CAMPO LIMPO), IRIS JOSÉ DE ARAUJO (HOSPITAL MUNICIPAL CAMPO LIMPO), PAULA LUÍSA LOPES SCHELL (HOSPITAL MUNICIPAL CAMPO LIMPO), MARÍLIA DE AGUIAR TAGLIETTA (HOSPITAL MUNICIPAL CAMPO LIMPO), YONE DI SARLI (HOSPITAL MUNICIPAL CAMPO LIMPO), LUIZA HELENA MADUREIRA (HOSPITAL MUNICIPAL CAMPO LIMPO)

Resumo: Introdução: Teratomas e hemangiomas são diagnósticos diferenciados de massas cervicais neonatais. O achado de uma massa cervical pode ser feito no pré-natal, através da ultrassonografia. Após o nascimento, havendo dúvida no diagnóstico é necessária a realização de exames complementares. Descrição do caso : Recém nascido, masculino, parto cesariana, peso 3090 g , Apgar 9/9, idade gestacional 38 semanas e 4 dias . Ultrassonografia Obstétrica de 32 semanas “imagem heterogênea de contornos regulares e limites precisos medindo 35x42x22 mm sugestivo de teratoma de face”. Na sala de parto presença de massa em região retroauricular esquerda de contornos regulares . Solicitado Ultrassom de partes moles com doppler “presença de nódulo sólido de contornos regulares, hipocogênico, medindo 3,8 x 2,1 x2,9 cm sugestivo de hemangioma”. Paciente estável, sem comprometimento respiratório e da amamentação. Obteve alta hospitalar em uso de propranolol e seguimento com cirurgia plástica. Discussão: Teratomas são tumores mais comuns na primeira e segunda infância. Sua localização habitual é a região gonadal e sacrococcígea, sendo a localização cervical incomum. Os hemangiomas congênitos são tumores vasculares infrequentes ,cuja fase proliferativa ocorre exclusivamente intra-uteró apresentando-se totalmente desenvolvidos ao nascimento ,são comuns no sexo masculino e localizam-se preferencialmente na cabeça, pescoço e membros. No Hemangioma congênito há o subtipo RICH, que evolui espontaneamente e o subtipo NICH, que não evolui espontaneamente. Conclusão: O reconhecimento das lesões precursoras , com o correto diagnóstico ao nascimento e encaminhamento precoce a um serviço de referência , contribuem para o resultado estético final da lesão. Alguns hemangiomas regressam espontaneamente, sendo necessário apenas acompanhamento ambulatorial, outros acompanham o crescimento do paciente, sendo necessária a intervenção. Atualmente , o tratamento de escolha dos hemangiomas é o propranolol. Quanto mais precoce iniciado o tratamento, melhor será o resultado final da lesão.