



Trabalhos Científicos

Título: Relevância Do Teste Da Linguinha Na Triagem Neonatal Realizados Pelo Serviço De Fonoaudiologia Em Uma Maternidade De Referência Do Estado Da Bahia

Autores: GABRIELE GUIMARÃES GONÇALVES (INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA - IPERBA - SALVADOR - BA), FABIANA MENEZES BARROS (INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA - IPERBA - SALVADOR - BA)

Resumo: Introdução: O Teste da Linguinha visa identificar alterações do frênulo lingual que interferem nas funções orofaciais. Essa pesquisa surgiu com o intuito de apresentar a eficiência desse instrumento. Objetivo: Demonstrar a importância da realização do Teste da Linguinha através dos dados estatísticos colhidos por meio de informações trazidas pela família, bem como pela avaliação do especialista no momento da avaliação anatômica e funcional da sucção através da amamentação, propondo o melhor tratamento para a anquiloglossia. Materiais e Métodos: A ferramenta de avaliação utilizada foi o Protocolo de Avaliação do Frênulo Lingual com escores para bebês (Martinelli, 2013). Período amostral de Jan/2018 a Dez/2018. Resultados: Foram realizados 961 Testes da Linguinha, sendo que 877 neonatos apresentaram resultado dentro do padrão de normalidade e 84 obtiveram pontuação total de frênulo lingual alterado e destes 63 pacientes fizeram frenotomia durante o ano de 2018. Conclusão: O estudo revela que aproximadamente 8,7 dos neonatos avaliados apresentaram anquiloglossia, valor que condiz com a literatura internacional na qual a ocorrência dessa doença tem um percentual elevado, entre 4 a 11, se comparado com a prevalência de outras alterações como a deficiência auditiva, detectada pelo Teste da Orelhinha, que varia de 0,1 a 0,6 dos neonatos. Todos os casos que foram encaminhados para tratamento da anquiloglossia, através da frenotomia, detectados pelo instrumento Protocolo de Avaliação do frenulo de língua para bebês de Martinelli 2013, as genitoras referiram melhora no processo de amamentação. Portanto observa-se a importância dessa triagem para evitar o desmame precoce de bebês com anquiloglossia. O exame pode ser realizado por qualquer profissional de Saúde capacitado, como pediatras, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, entre outros. O diagnóstico precoce é fundamental para prevenir problemas na amamentação, mastigação, deglutição e posteriormente no desenvolvimento da fala.