



## Trabalhos Científicos

**Título:** Teratoma Imaturo Ovariano Metastático: Um Relato De Caso.

**Autores:** JÉSSICA LOPES OLIVEIRA (UNIFAP), ELIZABETE STEYSE ROCHA AQUINO (UNIFAP), VITÓRIA NAZARÉ DIAS GONÇALVES (UNIFAP), FABRIZIO DO AMARAL MENDES (UNIFAP), DÉBORA MIRANDA DE CARVALHO COSTA (UNIFAP), GABRIEL CLEMENTE BRITO PEREIRA (UNIFAP)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: Os teratomas imaturos ovarianos são tumores de células germinativas raros, malignos, geralmente sólidos e unilaterais, com predominância entre 14 e 19 anos 1, tendo pior prognóstico relacionado a pacientes mais jovens. DESCRIÇÃO DO CASO: A. V. L. F., 14 anos. G0, P0, A0. Sem antecedentes familiares prévios, sem comorbidades prévias ou associadas. Foi submetida, em junho de 2018, a ooforectomia e anexectomia a direita, onde identificou-se ovário medindo 15cm, com múltiplos cistos de até 3cm. A partir da caracterização imuno-histoquímica, foi identificado teratoma composto imaturo. A citologia oncótica de líquido ascítico foi negativa. Paciente evoluiu com formação de nódulo pulmonar em lobo inferior esquerdo, identificado a partir de tomografia computadorizada (TC). A biópsia guiada de lesão pulmonar, confirmou metástase de teratoma composto imaturo. Exame de PET-TC demonstrou captação suspeita em nódulo único pulmonar, medindo 2,8cm, e linfonodomegalia em cadeia mesentérica. Proposto tratamento com esquema quimioterápico VIP (etoposídeo, ifosfamida e cisplatina). Paciente recebeu 5 ciclos de quimioterapia com resposta completa em linfonodos, porém aumento discreto em lesão pulmonar. No momento, paciente encontra-se em discussão quanto a terapia de resgate, sendo opções: ressecção cirúrgica da lesão e transplante autólogo. DISCUSSÃO: O tratamento de teratoma imaturo em estágios iniciais é cirúrgico. Tumores grau 2 ou 3, bilaterais, com implantes ou recidivas necessitam de abordagens multidisciplinares, envolvendo tratamento quimioterápico. No relato em questão, após o tratamento cirúrgico, a paciente apresentou metástase pulmonar e linfonodal, confirmada por biópsia. Diante de doença metastática, foi indicado quimioterapia com intuito definitivo. CONCLUSÃO: Teratoma imaturo são tumores raros. Não existem dados robustos que embasem um tratamento padrão para os teratomas imaturos. Apesar das peculiaridades desse tipo histológico, os esquemas de tratamento quimioterápico para os teratomas imaturos seguem os realizados para outros tumores germinativos de ovário.