



Trabalhos Científicos

Título: Hérnia De Bochdalek De Apresentação Tardia, Uma Possível Causa De Desforto Respiratório No Lactente – Relato De Cas

Autores: JULIANA DAL POZZO DE NOVAES (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), MONICA BARK CORRÊA BALDEZ (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), ANA PAULA COZER BANDEIRA (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), PÂMELA ROSSETTO (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), VANESSA BAIOCO (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), CRISTINA HELENA TEOLOGIDES MARCON (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), EDUARDO VIEIRA DE SOUZA (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), ANA CAROLINA GOYOS MADI (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS), FERNANDO COZER BANDEIRA (FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LUCAS)

Resumo: INTRODUÇÃO: Hérnia de Bochdalek é uma hérnia diafragmática congênita na qual há defeito do segmento posterolateral do diafragma, culminando em migração do conteúdo abdominal para região torácica. RELATO DO CASO: Lactente masculino, 2 meses, com tosse, desconforto respiratório, taquip-neico, com murmúrios abolidos no terço inferior de pulmão esquerdo. A radiografia de tórax de-monstrou hérnia diafragmática ocupando 2/3 de hemitórax esquerdo, com atelectasia em hemitó-rax direito, e a tomografia computadorizada corroborou o diagnóstico. Foi submetido à correção cirúrgica, com boa evolução pós operatória. DISCUSSÃO: As hérnias diafragmáticas de Bochdaleck constituem a alteração congênita dia-fragmática mais comum, sendo responsável por mais de 90 destas, apresentando-se em 75 a 90 dos casos do lado esquerdo. Apresenta diagnóstico em 5-25 dos casos em até 8 semanas de vida. É causa de insuficiência respiratória em neonatos. Pode ser diagnosticado através de exames de imagem do tórax os quais podem apresentar apagamento do seio costofrênico, eleva-ção de cúpula diafragmática e em alguns podem ser definidas imagens de alças intestinais colôni-cas e até mesmo sombra de vísceras parenquimatosas. A associação frequentemente encontrada é o derrame pleural.